

PremiX



GADO DE CORTE
PASTO

Linha Branca

Araguaia 40



Recria e terminação.

Suplemento mineral balanceado para a região norte do país.

40 a 70 g/animal/dia

Produto pronto para uso, indicado para animais a pasto. Deve ser fornecido à vontade aos animais em cocho saleiro, de preferência coberto, com uma metragem disponível de 5 a 8 cm lineares/animal ou conforme a orientação do nutricionista.



GARANTIA

Cálcio (Máx.)	115.00	g/kg
Cálcio (Mín.)	80.00	g/kg
Fósforo (Mín.)	40.00	g/kg
Enxofre (Mín.)	30.00	g/kg
Sódio (Mín.)	210.00	g/kg
Cobalto (Mín.)	68.00	mg/kg
Cobre (Mín.)	1200.00	mg/kg
Manganês (Mín.)	850.00	mg/kg
Zinco (Mín.)	3000.00	mg/kg
Selênio (Mín.)	17.00	mg/kg
Iodo (Mín.)	68.00	mg/kg
Flúor (Máx.)	400.00	mg/kg
Colina (Mín.)	100.00	mg/kg

kg: quilograma; **g:** grama; **mg:** miligrama; **UFC:** unidade formadora de colônia; **UI:** unidade internacional; **Kcal:** quilocaloria

Linha Branca

Araguaia 60



Recria e terminação.

Suplemento mineral balanceado para a região norte do país.

50 a 90 g/animal/dia

Produto pronto para uso, indicado para animais a pasto. Deve ser fornecido à vontade aos animais em cocho saleiro, de preferência coberto, com uma metragem disponível de 5 a 8 cm lineares/animal ou conforme a orientação do nutricionista.



GARANTIA

Cálcio (Máx.)	165.00	g/kg
Cálcio (Mín.)	120.00	g/kg
Fósforo (Mín.)	60.00	g/kg
Enxofre (Mín.)	40.00	g/kg
Sódio (Mín.)	145.00	g/kg
Cobalto (Mín.)	68.00	mg/kg
Cobre (Mín.)	1200.00	mg/kg
Manganês (Mín.)	850.00	mg/kg
Zinco (Mín.)	3000.00	mg/kg
Selênio (Mín.)	17.00	mg/kg
Iodo (Mín.)	68.00	mg/kg
Flúor (Máx.)	600.00	mg/kg
Colina (Mín.)	100.00	mg/kg

kg: quilograma; **g:** grama; **mg:** miligrama; **UFC:** unidade formadora de colônia; **UI:** unidade internacional; **Kcal:** quilocaloria

Linha Branca

Araguaia 60 20A



Recria e terminação.

Suplemento mineral balanceado para a região norte do país.

50 a 90 g/animal/dia

Produto pronto para uso, indicado para animais a pasto. Deve ser fornecido à vontade aos animais em cocho saleiro, de preferência coberto, com uma metragem disponível de 5 a 8 cm lineares/animal ou conforme a orientação do nutricionista.



GARANTIA

Cromo orgânico (Mín.)	0.45	mg/kg
Zinco orgânico (Mín.)	15.59	mg/kg
Mananoligossacarídeos (Mín.)	249.48	mg/kg
Ácido Linoleico (Mín.)	222.75	mg/kg
Cálcio (Máx.)	150.00	g/kg
Cálcio (Mín.)	120.00	g/kg
Fósforo (Mín.)	60.00	g/kg
Enxofre (Mín.)	40.00	g/kg
Sódio (Mín.)	140.60	g/kg
Cobalto (Mín.)	68.00	mg/kg
Cobre (Mín.)	1200.00	mg/kg
Manganês (Mín.)	850.00	mg/kg
Zinco (Mín.)	3000.00	mg/kg
Selênio (Mín.)	17.00	mg/kg
Iodo (Mín.)	68.00	mg/kg
Cromo orgânico (Mín.)	0.39	mg/kg
Flúor (Máx.)	600.00	mg/kg
Metionina (Mín.)	120.00	mg/kg
Tirosina (Mín.)	120.00	mg/kg
Vitamina B12 (Mín.)	24.90	µg/kg
Lisina (Mín.)	500.00	mg/kg
Colina (Mín.)	45.00	mg/kg
Ácido Oleico (Mín.)	0.20	mg/kg
Bacillus subtilis (Mín.)	6.23 x 10E8	ufc/kg
Bifidobacterium bifidum (Mín.)	4.67 x 10E8	ufc/kg
Enterococcus faecium (Mín.)	4.67 x 10E8	ufc/kg
Lactobacillus acidophilus (Mín.)	4.67 x 10E8	ufc/kg
Lactobacillus casei (Mín.)	4.05 x 10E8	ufc/kg
Lactobacillus lactis (Mín.)	2.18 x 10E8	ufc/kg
Glucomananos (Mín.)	870.00	mg/kg
Beta glucanos (Mín.)	620.00	mg/kg

kg: quilograma; g: grama; mg: miligrama; UFC: unidade formadora de colônia; UI: unidade internacional; Kcal: quilocaloria

Linha Branca

Araguaia 80



GARANTIA

Cálcio (Máx.)	180.00	g/kg
Cálcio (Mín.)	140.00	g/kg
Fósforo (Mín.)	80.00	g/kg
Enxofre (Mín.)	20.00	g/kg
Sódio (Mín.)	130.00	g/kg
Cobalto (Mín.)	68.00	mg/kg
Cobre (Mín.)	1200.00	mg/kg
Manganês (Mín.)	850.00	mg/kg
Zinco (Mín.)	3000.00	mg/kg
Selênio (Mín.)	17.00	mg/kg
Iodo (Mín.)	68.00	mg/kg
Flúor (Máx.)	800.00	mg/kg
Colina (Mín.)	100.00	mg/kg

kg: quilograma; **g:** grama; **mg:** miligrama; **UFC:** unidade formadora de colônia; **UI:** unidade internacional; **Kcal:** quilocaloria

Cria, recria e terminação.

Suplemento mineral balanceado para a região norte do país.

60 a 100 g/animal/dia

Produto pronto para uso, indicado para animais a pasto. Deve ser fornecido à vontade aos animais em cocho saleiro, de preferência coberto, com uma metragem disponível de 5 a 8 cm lineares/animal ou conforme a orientação do nutricionista.



Linha Branca

Araguaia 80 20A



Cria, recria e terminação.

Suplemento mineral balanceado para a região norte do país.

60 a 100 g/animal/dia

Produto pronto para uso, indicado para animais a pasto. Deve ser fornecido à vontade aos animais em cocho saleiro, de preferência coberto, com uma metragem disponível de 5 a 8 cm lineares/animal ou conforme a orientação do nutricionista.



GARANTIA

Enxofre (Mín.)	20.00	g/kg
Sódio (Mín.)	130.00	g/kg
Cobalto (Mín.)	68.00	mg/kg
Cobre (Mín.)	1200.00	mg/kg
Manganês (Mín.)	850.00	mg/kg
Zinco (Mín.)	3000.00	mg/kg
Selênio (Mín.)	17.00	mg/kg
Iodo (Mín.)	68.00	mg/kg
Flúor (Máx.)	800.00	mg/kg
Metionina (Mín.)	130.00	mg/kg
Tirosina (Mín.)	120.00	mg/kg
Vitamina B12 (Mín.)	24.90	µg/kg
Lisina (Mín.)	500.00	mg/kg
Colina (Mín.)	45.00	mg/kg
Cromo orgânico (Mín.)	0.45	mg/kg
Zinco orgânico (Mín.)	15.50	mg/kg
Mananligossacarídeos (Mín.)	249.40	mg/kg
Ácido Linoleico (Mín.)	222.75	mg/kg
Ácido Oleico (Mín.)	0.20	mg/kg
Bacillus subtilis (Mín.)	6.23 x 10E8	ufc/kg
Bifidobacterium bifidum (Mín.)	4.67 x 10E8	ufc/kg
Enterococcus faecium (Mín.)	4.67 x 10E8	ufc/kg
Lactobacillus acidophilus (Mín.)	4.67 x 10E8	ufc/kg
Lactobacillus casei (Mín.)	4.05 x 10E8	ufc/kg
Lactobacillus lactis (Mín.)	2.18 x 10E8	ufc/kg
Glucomananos (Mín.)	870.00	mg/kg
Beta glucanos (Mín.)	620.00	mg/kg
Cálcio (Máx.)	180.00	g/kg
Cálcio (Mín.)	130.00	g/kg
Fósforo (Mín.)	80.00	g/kg

kg: quilograma; **g:** grama; **mg:** miligrama; **UFC:** unidade formadora de colônia; **UI:** unidade internacional; **Kcal:** quilocaloria

Linha Branca

Araguaia 90



GARANTIA

Cobalto (Mín.)	80.00	mg/kg
Cobre (Mín.)	800.00	mg/kg
Manganês (Mín.)	50.00	mg/kg
Zinco (Mín.)	2500.00	mg/kg
Selênio (Mín.)	20.00	mg/kg
Iodo (Mín.)	70.00	mg/kg
Flúor (Máx.)	900.00	mg/kg
Cálcio (Máx.)	200.00	g/kg
Cálcio (Mín.)	150.00	g/kg
Fósforo (Mín.)	90.00	g/kg
Enxofre (Mín.)	20.00	g/kg
Sódio (Mín.)	120.00	g/kg

kg: quilograma; **g:** grama; **mg:** miligrama; **UFC:** unidade formadora de colônia; **UI:** unidade internacional; **Kcal:** quilocaloria

Cria, recria e terminação.

Suplemento mineral balanceado para a região norte do país.

60 a 100 g/animal/dia

Produto pronto para uso, indicado para animais a pasto. Deve ser fornecido à vontade aos animais em cocho saleiro, de preferência coberto, com uma metragem disponível de 5 a 8 cm lineares/animal ou conforme a orientação do nutricionista.



Linha Branca

Araguaia Cromo Águas Vaca



GARANTIA

NDT (Mín.)	100.00	g/kg
Proteína Bruta (Mín.)	200.00	g/kg
NNP – Equiv. Proteico (Máx.)	180.00	g/kg
Cálcio (Máx.)	120.00	g/kg
Cálcio (Mín.)	50.00	g/kg
Fósforo (Mín.)	60.00	g/kg
Magnésio (Mín.)	5000.00	mg/kg
Enxofre (Mín.)	20.00	g/kg
Sódio (Mín.)	110.00	g/kg
Cobalto (Mín.)	78.00	mg/kg
Cobre (Mín.)	675.00	mg/kg
Manganês (Mín.)	660.00	mg/kg
Zinco (Mín.)	2500.00	mg/kg
Selênio (Mín.)	13.00	mg/kg
Iodo (Mín.)	50.00	mg/kg
Flúor (Máx.)	600.00	mg/kg
Salinomicina (Mín.)	600.00	mg/kg
Cromo orgânico (Mín.)	12.00	mg/kg

kg: quilograma; **g:** grama; **mg:** miligrama; **UFC:** unidade formadora de colônia; **UI:** unidade internacional; **Kcal:** quilocaloria

Produto indicado para bovinos em reprodução durante o período das águas e pastagens com boa disponibilidade de massa.

Suplemento mineral proteico para bovinos. Este produto corrige desequilíbrios nutricionais e potencializa a degradação da fração fibrosa, disponibilizando mais energia, além de aumentar a utilização de nitrogênio das forrageiras verdes no período das águas.

150 a 200 g/animal/dia. Pode ser utilizado puro ou misturado em farelos energéticos (milho, sorgo e outros) na proporção de 20% do produto com 80% de farelo e fornecer 1 kg a 1,5 kg/animal/dia, com disponibilidade de uma área de cocho de 30 a 40 cm linear por animal.

Produto indicado para animais em reprodução durante o período das águas e pastagens com boa disponibilidade de massa. Enriquecido com cromo, aditivado com melhorador de desempenho e com combinação de diferentes fontes de NNP (ureia e ureia de liberação lenta).

Fornecer puro, à vontade, em cochos cobertos preferencialmente, ou que evitem acúmulo de água. Deve ser disponibilizado de 10 a 15 cm lineares de cocho por animal e em pastos com boa oferta de massa, ou conforme a orientação do nutricionista.

Esse produto contém ureia, não fornecer para equídeos.

Linha Branca

Conversor MC



Recria e engorda.

Suplemento mineral pronto para uso. Indicado para incrementar o ganho de peso de bovinos de corte, nas fases recria e engorda.

40 a 50 g/100 kg PC/dia

Produto pronto para uso. Colocar no cocho à disposição dos animais.



GARANTIA

Cálcio (Máx.)	240.00	g/kg
Cálcio (Mín.)	180.00	g/kg
Fósforo (Mín.)	30.00	g/kg
Magnésio (Mín.)	2500.00	mg/kg
Enxofre (Mín.)	18.00	g/kg
Sódio (Mín.)	78.00	g/kg
Cobalto (Mín.)	80.00	mg/kg
Cobre (Mín.)	800.00	mg/kg
Manganês (Mín.)	50.00	mg/kg
Zinco (Mín.)	2500.00	mg/kg
Selênio (Mín.)	20.00	mg/kg
Iodo (Mín.)	70.00	mg/kg
Flúor (Máx.)	300.00	mg/kg
Metionina (Mín.)	90.00	mg/kg
Tirosina (Mín.)	90.00	mg/kg
Vitamina B12 (Mín.)	18.87	µg/kg
Lisina (Mín.)	300.00	mg/kg
Níquel (Mín.)	6.00	mg/kg
Colina (Mín.)	34.00	mg/kg
Cromo orgânico (Mín.)	0.34	mg/kg
Zinco orgânico (Mín.)	11.70	mg/kg
Mananligossacarídeos (Mín.)	188.00	mg/kg
Ácido Linoleico (Mín.)	168.00	mg/kg
Ácido Oleico (Mín.)	0.15	mg/kg
Bacillus subtilis (Mín.)	4.71 x 10E8	ufc/kg
Bifidobacterium bifidum (Mín.)	3.53 x 10E8	ufc/kg
Enterococcus faecium (Mín.)	3.53 x 10E8	ufc/kg
Lactobacillus acidophilus (Mín.)	3.53 x 10E8	ufc/kg
Lactobacillus casei (Mín.)	3.06 x 10E8	ufc/kg
Lactobacillus lactis (Mín.)	1.65 x 10E8	ufc/kg
Glucomananos (Mín.)	650.00	mg/kg
Beta glucanos (Mín.)	470.00	mg/kg
Adsorvente de micotoxinas (Mín.)	1570.00	mg/kg

kg: quilograma; g: grama; mg: miligrama; UFC: unidade formadora de colônia; UI: unidade internacional; Kcal: quilocaloria

Linha Branca

Conversor Next MC



Recria e engorda.

Suplemento mineral pronto para uso. Indicado para incrementar o ganho de peso de bovinos de corte, nas fases recría e engorda.

40 a 50 g/100 kg PC/dia

Produto pronto para uso. Colocar no cocho à disposição dos animais. Fornecer o produto sempre em cochões cobertos e/ou com sistema que evite o acúmulo de água; manter boa disponibilidade de pasto ou qualquer outro volumoso.

Esse produto contém ureia não fornecer para equídeos.



GARANTIA

Fósforo (Mín.)	30.00	g/kg
Magnésio (Mín.)	2500.00	mg/kg
Enxofre (Mín.)	18.00	g/kg
Sódio (Mín.)	78.00	g/kg
Cobalto (Mín.)	80.00	mg/kg
Cobre (Mín.)	800.00	mg/kg
Manganês (Mín.)	50.00	mg/kg
Zinco (Mín.)	2500.00	mg/kg
Selênio (Mín.)	20.00	mg/kg
Iodo (Mín.)	70.00	mg/kg
Flúor (Máx.)	300.00	mg/kg
Vitamina B12 (Mín.)	18.87	µg/kg
Níquel (Mín.)	6.00	mg/kg
Cromo orgânico (Mín.)	0.34	mg/kg
Zinco orgânico (Mín.)	11.50	mg/kg
Mananoligossacarídeos (Mín.)	180.00	mg/kg
Ácido Linoleico (Mín.)	168.00	mg/kg
Ácido Oleico (Mín.)	0.15	mg/kg
Bacillus subtilis (Mín.)	4.71 x 10E8	ufc/kg
Bifidobacterium bifidum (Mín.)	3.53 x 10E8	ufc/kg
Enterococcus faecium (Mín.)	3.53 x 10E8	ufc/kg
Lactobacillus acidophilus (Mín.)	3.53 x 10E8	ufc/kg
Lactobacillus casei (Mín.)	3.06 x 10E8	ufc/kg
Lactobacillus lactis (Mín.)	1.65 x 10E8	ufc/kg
Glucomananos (Mín.)	650.00	mg/kg
Beta glucanos (Mín.)	470.00	mg/kg
Adsorvente de micotoxinas (Mín.)	1500.00	mg/kg
Proteína Bruta (Mín.)	100.00	g/kg
NNP – Equiv. Proteico (Máx.)	100.00	g/kg
Cálcio (Máx.)	240.00	g/kg
Cálcio (Mín.)	180.00	g/kg

kg: quilograma; **g:** grama; **mg:** miligrama; **UFC:** unidade formadora de colônia; **UI:** unidade internacional; **Kcal:** quilocaloria

Linha Branca

Conversor Reprodução Next MC



Cria.

Suplemento mineral Indicado para bovinos de corte na fase de cria, especialmente matrizes e reprodutores. Este produto foi desenvolvido para ser utilizado no período de boa vegetatividade do capim (período das chuvas).

40 a 50 g/100 kg PC/dia

Produto pronto para uso. Colocar no cocho à disposição dos animais. Fornecer o produto sempre em cochos cobertos e/ou com sistema que evite o acúmulo de água; manter boa disponibilidade de pasto ou qualquer outro volumoso.

Esse produto contém ureia, não fornecer para equídeos.

GARANTIA

Proteína Bruta (Mín.)	100.00	g/kg
NNP – Equiv. Proteico (Máx.)	100.00	g/kg
Zinco orgânico (Mín.)	12.80	mg/kg
Cálcio (Máx.)	260.00	g/kg
Cálcio (Mín.)	172.00	g/kg
Fósforo (Mín.)	45.00	g/kg
Magnésio (Mín.)	2500.00	mg/kg
Enxofre (Mín.)	18.00	g/kg
Sódio (Mín.)	78.00	g/kg
Cobalto (Mín.)	80.00	mg/kg
Cobre (Mín.)	800.00	mg/kg
Manganês (Mín.)	50.00	mg/kg
Zinco (Mín.)	2500.00	mg/kg
Mananoligossacarídeos (Mín.)	205.00	mg/kg
Selênio (Mín.)	20.00	mg/kg
Iodo (Mín.)	70.00	mg/kg
Flúor (Máx.)	450.00	mg/kg
Metionina (Mín.)	100.00	mg/kg
Tirosina (Mín.)	90.00	mg/kg
Vitamina B12 (Mín.)	20.50	µg/kg
Níquel (Mín.)	4.00	mg/kg
Colina (Mín.)	37.00	mg/kg
Cromo orgânico (Mín.)	0.37	mg/kg
Ácido Linoleico (Mín.)	183.00	mg/kg
Ácido Oleico (Mín.)	0.17	mg/kg
Bacillus subtilis (Mín.)	5.12 x 10E8	ufc/kg
Bifidobacterium bifidum (Mín.)	3.84 x 10E8	ufc/kg
Enterococcus faecium (Mín.)	3.84 x 10E8	ufc/kg
Lactobacillus acidophilus (Mín.)	3.84 x 10E8	ufc/kg
Lactobacillus casei (Mín.)	3.33 x 10E8	ufc/kg
Lactobacillus lactis (Mín.)	1.79 x 10E8	ufc/kg
Glucomananos (Mín.)	710.00	mg/kg
Beta glucanos (Mín.)	510.00	mg/kg
Adsorvente de micotoxinas (Mín.)	1700.00	mg/kg

kg: quilograma; **g:** grama; **mg:** miligrama; **UFC:** unidade formadora de colônia; **UI:** unidade internacional; **Kcal:** quilocaloria



Linha Branca

Fós Premium



Reprodução.

Suplemento mineral contendo aminoácidos enriquecido com Fator P. Este produto corrige desequilíbrios nutricionais de origens carenciais ou metabólicas, proporcionando melhores condições reprodutivas e melhor resposta imunológica.

80 a 130 g/animal/dia.

Produto pronto para uso, indicado para todas as categorias de bovinos, doadoras, receptoras de embriões, inseminação artificial, transferências de embriões e rebanhos em período de monta. Deve ser fornecido à vontade aos animais em cocho saheiro, de preferência coberto, com uma metragem disponível de 5 a 8 cm lineares/animal ou conforme a orientação do nutricionista.



GARANTIA

Saccharomyces cerevisiae (Mín.)	2.60 x 10E9	ufc/kg
Lisina (Mín.)	130.00	mg/kg
Colina (Mín.)	1040.00	mg/kg
Cromo orgânico (Mín.)	10.00	mg/kg
Zinco orgânico (Mín.)	27.30	mg/kg
Mananligossacarídeos (Mín.)	156.00	mg/kg
Ácido Linoleico (Mín.)	52.33	mg/kg
Ácido Oleico (Mín.)	44.40	mg/kg
Ômega 3 (Mín.)	7.67	mg/kg
Ômega 6 (Mín.)	52.30	mg/kg
Ômega 9 (Mín.)	48.80	mg/kg
Cálcio (Máx.)	180.00	g/kg
Cálcio (Mín.)	140.00	g/kg
Fósforo (Mín.)	90.00	g/kg
Magnésio (Mín.)	15.00	g/kg
Enxofre (Mín.)	12.00	g/kg
Sódio (Mín.)	99.00	g/kg
Cobalto (Mín.)	168.00	mg/kg
Cobre (Mín.)	2000.00	mg/kg
Manganês (Mín.)	1500.00	mg/kg
Zinco (Mín.)	4000.00	mg/kg
Selênio (Mín.)	38.00	mg/kg
Iodo (Mín.)	200.00	mg/kg
Flúor (Máx.)	900.00	mg/kg
Metionina (Mín.)	10.00	mg/kg
Tirosina (Mín.)	20.00	mg/kg

kg: quilograma; **g:** grama; **mg:** miligrama; **UFC:** unidade formadora de colônia; **UI:** unidade internacional; **Kcal:** quilocaloria

Linha Branca

Mineral Maior Next MC



Recria e engorda.

Suplemento mineral indicado para bovinos de corte, nas fases recria e engorda. Este produto foi desenvolvido para ser utilizado no período de boa vegetatividade do capim (período de chuvas).

20 a 25 de produto/100 kg PC/dia

Produto pronto para uso. Colocar no cocho à disposição dos animais. Fornecer o produto sempre em cochos cobertos e/ou com sistema que evite o acúmulo de água; manter boa disponibilidade de pasto ou qualquer outro volumoso.

Esse produto contém ureia não fornecer para eqüídeos.



GARANTIA

NNP – Equiv. Proteico (Máx.)	126.50	g/kg
Cálcio (Máx.)	190.00	g/kg
Cálcio (Mín.)	120.00	g/kg
Fósforo (Mín.)	80.00	g/kg
Magnésio (Mín.)	5000.00	mg/kg
Enxofre (Mín.)	10.00	g/kg
Sódio (Mín.)	117.00	g/kg
Cobalto (Mín.)	180.00	mg/kg
Cobre (Mín.)	2160.00	mg/kg
Manganês (Mín.)	970.00	mg/kg
Zinco (Mín.)	6480.00	mg/kg
Selênio (Mín.)	32.00	mg/kg
Iodo (Mín.)	160.00	mg/kg
Flúor (Máx.)	800.00	mg/kg
Níquel (Mín.)	8.00	mg/kg
Cromo orgânico (Mín.)	16.00	mg/kg
Flavomicina (Mín.)	200.00	mg/kg

kg: quilograma; **g:** grama; **mg:** miligrama; **UFC:** unidade formadora de colônia; **UI:** unidade internacional; **Kcal:** quilocaloria

Linha Branca

Mineral Maior Up



Recria e terminação.

Suplemento mineral indicado para bovinos de corte, nas fases de crescimento (recria) e engorda (terminação). Este produto foi desenvolvido para ser utilizado no período de boa vegetatividade do capim (período das águas).

20 a 25 g/100 kg PC/dia

Produto pronto para uso. Colocar no cocho à disposição dos animais. Fornecer o produto sempre em cochos cobertos e/ou com sistema que evite o acúmulo de água; manter boa disponibilidade de pasto ou qualquer outro volumoso.

Esse produto contém ureia não fornecer para equídeos.



GARANTIA

Enxofre (Mín.)	10.00	g/kg
Cobalto (Mín.)	180.00	mg/kg
Cobre (Mín.)	2160.00	mg/kg
Manganês (Mín.)	970.00	mg/kg
Zinco (Mín.)	6480.00	mg/kg
Selênio (Mín.)	32.00	mg/kg
Iodo (Mín.)	160.00	mg/kg
Flúor (Máx.)	800.00	mg/kg
Níquel (Mín.)	8.00	mg/kg
Cromo orgânico (Mín.)	16.00	mg/kg
Flavomicina (Mín.)	200.00	mg/kg
NNP – Equiv. Proteico (Máx.)	200.00	g/kg
Cálcio (Máx.)	190.00	g/kg
Cálcio (Mín.)	120.00	g/kg
Fósforo (Mín.)	80.00	g/kg
Magnésio (Mín.)	5000.00	mg/kg
Sódio (Mín.)	117.00	g/kg

kg: quilograma; **g:** grama; **mg:** miligrama; **UFC:** unidade formadora de colônia; **UI:** unidade internacional; **Kcal:** quilocaloria

Linha Branca

Nitrogenado 40 Flex L.A



Cria, recria e engorda.

É indicado para bovinos de corte, nas fases de cria, recria e engorda.

20 a 40 g/100 kg PC/dia

Fornecer o produto sempre em cochos cobertos e/ou com sistema que evite o acúmulo de água; manter boa disponibilidade de pasto ou qualquer outro volumoso

Esse produto contém Ureia não fornecer para equídeos.



GARANTIA

Proteína Bruta (Mín.)	200.00	g/kg
NNP – Equiv. Proteico (Máx.)	200.00	g/kg
Cálcio (Máx.)	220.00	g/kg
Cálcio (Mín.)	130.00	g/kg
Fósforo (Mín.)	40.00	g/kg
Magnésio (Mín.)	4000.00	mg/kg
Enxofre (Mín.)	10.00	g/kg
Sódio (Mín.)	110.00	g/kg
Cobalto (Mín.)	80.00	mg/kg
Cobre (Mín.)	800.00	mg/kg
Manganês (Mín.)	50.00	mg/kg
Zinco (Mín.)	2500.00	mg/kg
Selênio (Mín.)	20.00	mg/kg
Iodo (Mín.)	70.00	mg/kg
Flúor (Máx.)	400.00	mg/kg

kg: quilograma; **g:** grama; **mg:** miligrama; **UFC:** unidade formadora de colônia; **UI:** unidade internacional; **Kcal:** quilocaloria

Linha Branca

Núcleo Crescimento Next MC



Cria, recria e terminação.

Núcleo indicado para formulação de suplementos para bovinos de corte.

20 a 25 g/100 kg PC/dia (após a mistura).

Produto para mistura, devendo ser adicionado no sal branco (Cloreto de Sódio) antes de ser oferecido aos animais. Misturar 02 sacos (50kg) de Núcleo Crescimento Next MC em 1 saco (25kg) de sal branco. Colocar a mistura final à disposição dos animais no cocho. Este produto é aditivado com melhorador de desempenho flavomicina.



GARANTIA

Cálcio (Máx.)	300.00	g/kg
Cálcio (Mín.)	182.00	g/kg
Fósforo (Mín.)	120.00	g/kg
Magnésio (Mín.)	7500.00	mg/kg
Enxofre (Mín.)	15.00	g/kg
Cobalto (Mín.)	150.00	mg/kg
Cobre (Mín.)	1800.00	mg/kg
Manganês (Mín.)	810.00	mg/kg
Zinco (Mín.)	5400.00	mg/kg
Selênio (Mín.)	27.00	mg/kg
Iodo (Mín.)	135.00	mg/kg
Flúor (Máx.)	1200.00	mg/kg
Níquel (Mín.)	12.00	mg/kg
Cromo orgânico (Mín.)	24.00	mg/kg
Flavomicina (Mín.)	300.00	mg/kg

kg: quilograma; **g:** grama; **mg:** miligrama; **UFC:** unidade formadora de colônia; **UI:** unidade internacional; **Kcal:** quilocaloria

Linha Branca

Phós 40



GARANTIA

Cálcio (Máx.)	200.00	g/kg
Cálcio (Mín.)	150.00	g/kg
Fósforo (Mín.)	40.00	g/kg
Enxofre (Mín.)	10.00	g/kg
Sódio (Mín.)	120.00	g/kg
Cobalto (Mín.)	80.00	mg/kg
Cobre (Mín.)	800.00	mg/kg
Manganês (Mín.)	50.00	mg/kg
Zinco (Mín.)	2500.00	mg/kg
Selênio (Mín.)	20.00	mg/kg
Iodo (Mín.)	70.00	mg/kg
Flúor (Máx.)	400.00	mg/kg

kg: quilograma; **g:** grama; **mg:** miligrama; **UFC:** unidade formadora de colônia; **UI:** unidade internacional; **Kcal:** quilocaloria

Terminação.

Suplemento mineral balanceado para bovinos.

40 a 60 g/animal/dia

Produto pronto para uso, indicado para animais em pastagem de boa qualidade. Deve ser fornecido à vontade aos animais em cocho saleiro, de preferência coberto, com uma metragem disponível de 5 a 8 cm lineares/animal ou conforme a orientação do nutricionista.



Linha Branca

Phós 40 20A



Terminação.

Suplemento mineral balanceado para bovinos.

40 a 60 g/animal/dia

Produto pronto para uso, indicado para animais em pastagem de boa qualidade. Deve ser fornecido à vontade aos animais em cocho saleiro, de preferência coberto, com uma metragem disponível de 5 a 8 cm lineares/animal ou conforme a orientação do nutricionista.



GARANTIA

Lactobacillus casei (Mín.)	5.40 x 10E8	ufc/kg
Cálcio (Máx.)	200.00	g/kg
Cálcio (Mín.)	150.00	g/kg
Fósforo (Mín.)	40.00	g/kg
Enxofre (Mín.)	10.00	g/kg
Sódio (Mín.)	120.00	g/kg
Cobalto (Mín.)	80.00	mg/kg
Cobre (Mín.)	800.00	mg/kg
Manganês (Mín.)	50.00	mg/kg
Zinco (Mín.)	2500.00	mg/kg
Selênio (Mín.)	20.00	mg/kg
Iodo (Mín.)	70.00	mg/kg
Flúor (Máx.)	400.00	mg/kg
Colina (Mín.)	60.00	mg/kg
Cromo orgânico (Mín.)	0.60	mg/kg
Zinco orgânico (Mín.)	20.50	mg/kg
Mananligossacarídeos (Mín.)	330.00	mg/kg
Ácido Linoleico (Mín.)	297.00	mg/kg
Ácido Oleico (Mín.)	0.27	mg/kg
Bacillus subtilis (Mín.)	8.31 x 10E8	ufc/kg
Bifidobacterium bifidum (Mín.)	6.23 x 10E8	ufc/kg
Enterococcus faecium (Mín.)	6.23 x 10E8	ufc/kg
Lactobacillus acidophilus (Mín.)	6.23 x 10E8	ufc/kg
Lactobacillus lactis (Mín.)	2.91 x 10E8	ufc/kg
Glucomananos (Mín.)	1160.00	mg/kg
Beta glucanos (Mín.)	830.00	mg/kg

kg: quilograma; **g:** grama; **mg:** miligrama; **UFC:** unidade formadora de colônia; **UI:** unidade internacional; **Kcal:** quilocaloria

Linha Branca

Phós 60



GARANTIA

Cálcio (Máx.)	200.00	g/kg
Cálcio (Mín.)	150.00	g/kg
Fósforo (Mín.)	60.00	g/kg
Enxofre (Mín.)	10.00	g/kg
Sódio (Mín.)	120.00	g/kg
Cobalto (Mín.)	80.00	mg/kg
Cobre (Mín.)	800.00	mg/kg
Manganês (Mín.)	50.00	mg/kg
Zinco (Mín.)	2500.00	mg/kg
Selênio (Mín.)	20.00	mg/kg
Iodo (Mín.)	70.00	mg/kg
Flúor (Máx.)	600.00	mg/kg

kg: quilograma; **g:** grama; **mg:** miligrama; **UFC:** unidade formadora de colônia; **UI:** unidade internacional; **Kcal:** quilocaloria

Cria, recria e terminação.

Suplemento mineral balanceado para bovinos.

50 a 70 g/animal/dia.

Produto pronto para uso, indicado para animais em fase de cria, recria e terminação em pastagem de média e boa qualidade. Deve ser fornecido à vontade aos animais em cocho saleiro, de preferência coberto, com uma metragem disponível de 5 a 8 cm lineares/animal ou conforme a orientação do nutricionista.



Linha Branca

Phós 60 20A



Cria, recria e terminação.

Suplemento mineral balanceado para bovinos.

50 a 70 g/animal/dia

Produto pronto para uso, indicado para animais em fase de cria, recria e terminação em pastagem de média e boa qualidade. Deve ser fornecido à vontade aos animais em cocho saleiro, de preferência coberto, com uma metragem disponível de 5 a 8 cm lineares/animal ou conforme a orientação do nutricionista.



GARANTIA

Cálcio (Máx.)	200.00	g/kg
Cálcio (Mín.)	150.00	g/kg
Fósforo (Mín.)	60.00	g/kg
Enxofre (Mín.)	10.00	g/kg
Sódio (Mín.)	120.00	g/kg
Cobalto (Mín.)	80.00	mg/kg
Cobre (Mín.)	800.00	mg/kg
Manganês (Mín.)	50.00	mg/kg
Zinco (Mín.)	2500.00	mg/kg
Selênio (Mín.)	20.00	mg/kg
Iodo (Mín.)	70.00	mg/kg
Flúor (Máx.)	600.00	mg/kg
Metionina (Mín.)	175.00	mg/kg
Tirosina (Mín.)	161.00	mg/kg
Vitamina B12 (Mín.)	33.20	µg/kg
Lisina (Mín.)	680.00	mg/kg
Colina (Mín.)	60.00	mg/kg
Cromo orgânico (Mín.)	0.60	mg/kg
Zinco orgânico (Mín.)	20.70	mg/kg
Mananligossacarídeos (Mín.)	332.64	mg/kg
Ácido Linoleico (Mín.)	297.00	mg/kg
Ácido Oleico (Mín.)	0.27	mg/kg
Bacillus subtilis (Mín.)	8.31 x 10E8	ufc/kg
Bifidobacterium bifidum (Mín.)	6.23 x 10E8	ufc/kg
Enterococcus faecium (Mín.)	6.23 x 10E8	ufc/kg
Lactobacillus acidophilus (Mín.)	6.23 x 10E8	ufc/kg
Lactobacillus casei (Mín.)	5.40 x 10E8	ufc/kg
Lactobacillus lactis (Mín.)	2.91 x 10E8	ufc/kg
Glucomananos (Mín.)	1160.00	mg/kg
Beta glucanos (Mín.)	830.00	mg/kg

kg: quilograma; **g:** grama; **mg:** miligrama; **UFC:** unidade formadora de colônia; **UI:** unidade internacional; **Kcal:** quilocaloria

Linha Branca

Phós 80



GARANTIA

Cálcio (Máx.)	200.00	g/kg
Cálcio (Mín.)	150.00	g/kg
Fósforo (Mín.)	80.00	g/kg
Enxofre (Mín.)	10.00	g/kg
Sódio (Mín.)	120.00	g/kg
Cobalto (Mín.)	80.00	mg/kg
Cobre (Mín.)	800.00	mg/kg
Manganês (Mín.)	50.00	mg/kg
Zinco (Mín.)	2500.00	mg/kg
Selênio (Mín.)	20.00	mg/kg
Iodo (Mín.)	70.00	mg/kg
Flúor (Máx.)	800.00	mg/kg

kg: quilograma; **g:** grama; **mg:** miligrama; **UFC:** unidade formadora de colônia; **UI:** unidade internacional; **Kcal:** quilocaloria

Cria, recria e terminação.

Suplemento mineral balanceado para bovinos.

70 a 90 g/animal/dia

Produto pronto para uso, indicado para animais em qualquer tipo de pastagem. Deve ser fornecido à vontade aos animais em cocho saleiro, de preferência coberto, com uma metragem disponível de 5 a 8 cm lineares/animal ou conforme a orientação do nutricionista.



Linha Branca

Phós 80 20A



Cria, recria e terminação.

Suplemento mineral balanceado para bovinos.

70 a 90 g/animal/dia

Produto pronto para uso, indicado para animais em qualquer tipo de pastagem. Deve ser fornecido à vontade aos animais em cocho saleiro, de preferência coberto, com uma metragem disponível de 5 a 8 cm lineares/animal ou conforme a orientação do nutricionista.



GARANTIA

Cobalto (Mín.)	80.00	mg/kg
Cobre (Mín.)	800.00	mg/kg
Manganês (Mín.)	50.00	mg/kg
Zinco (Mín.)	2500.00	mg/kg
Selênio (Mín.)	20.00	mg/kg
Iodo (Mín.)	70.00	mg/kg
Flúor (Máx.)	800.00	mg/kg
Metionina (Mín.)	170.00	mg/kg
Tirosina (Mín.)	160.00	mg/kg
Vitamina B12 (Mín.)	33.30	µg/kg
Lisina (Mín.)	680.00	mg/kg
Colina (Mín.)	60.00	mg/kg
Cromo orgânico (Mín.)	0.60	mg/kg
Zinco orgânico (Mín.)	20.78	mg/kg
Manan oligossacarídeos (Mín.)	332.64	mg/kg
Ácido Linoleico (Mín.)	297.00	mg/kg
Ácido Oleico (Mín.)	0.27	mg/kg
Bacillus subtilis (Mín.)	8.31 x 10E8	ufc/kg
Bifidobacterium bifidum (Mín.)	6.23 x 10E8	ufc/kg
Enterococcus faecium (Mín.)	6.23 x 10E8	ufc/kg
Lactobacillus acidophilus (Mín.)	6.23 x 10E8	ufc/kg
Lactobacillus casei (Mín.)	5.40 x 10E8	ufc/kg
Lactobacillus lactis (Mín.)	2.91 x 10E8	ufc/kg
Glucomananos (Mín.)	1160.00	mg/kg
Beta glucanos (Mín.)	830.00	mg/kg
Cálcio (Máx.)	200.00	g/kg
Cálcio (Mín.)	150.00	g/kg
Fósforo (Mín.)	80.00	g/kg
Enxofre (Mín.)	10.00	g/kg
Sódio (Mín.)	120.00	g/kg

kg: quilograma; g: grama; mg: miligrama; UFC: unidade formadora de colônia; UI: unidade internacional; Kcal: quilocaloria

Linha Branca

Phós 90



GARANTIA

Cálcio (Máx.)	200.00	g/kg
Cálcio (Mín.)	150.00	g/kg
Fósforo (Mín.)	90.00	g/kg
Enxofre (Mín.)	10.00	g/kg
Sódio (Mín.)	120.00	g/kg
Cobalto (Mín.)	80.00	mg/kg
Cobre (Mín.)	800.00	mg/kg
Manganês (Mín.)	50.00	mg/kg
Zinco (Mín.)	2500.00	mg/kg
Selênio (Mín.)	20.00	mg/kg
Iodo (Mín.)	70.00	mg/kg
Flúor (Máx.)	900.00	mg/kg

kg: quilograma; **g:** grama; **mg:** miligrama; **UFC:** unidade formadora de colônia; **UI:** unidade internacional; **Kcal:** quilocaloria

Cria, recria e terminação.

Suplemento mineral balanceado para bovinos.

70 a 200 g/animal/dia

Produto pronto para uso, indicado para animais em qualquer tipo de pastagem. Deve ser fornecido à vontade aos animais em cocho saleiro, de preferência coberto, com uma metragem disponível de 5 a 8 cm lineares/animal ou conforme a orientação do nutricionista.



Linha Branca

Premiphós 130



GARANTIA

Cálcio (Máx.)	270.00	g/kg
Cálcio (Mín.)	240.00	g/kg
Fósforo (Mín.)	130.00	g/kg
Enxofre (Mín.)	4000.00	mg/kg
Cobalto (Mín.)	210.00	mg/kg
Cobre (Mín.)	2100.00	mg/kg
Manganês (Mín.)	1830.00	mg/kg
Zinco (Mín.)	6000.00	mg/kg
Selênio (Mín.)	20.00	mg/kg
Iodo (Mín.)	200.00	mg/kg
Flúor (Máx.)	1300.00	mg/kg

kg: quilograma; **g:** grama; **mg:** miligrama; **UFC:** unidade formadora de colônia; **UI:** unidade internacional; **Kcal:** quilocaloria

Cria, recria e terminação.

Suplemento mineral. Este produto é produzido com matérias-primas de alta tecnologia e biodisponibilidade, proporcionando o equilíbrio nutricional.

Variável, conforme diluição.

Produto indicado para bovinos de corte. Misturar em sal branco.

Sugestões de misturas

Pastagens ou dietas de baixo valor nutricional

Cria e recria: 75 kg de produto + 50 kg de sal branco.
Terminação: 50 kg de produto + 50 kg de sal branco.

Pastagens ou dietas de médio a alto valor nutricional

Cria e recria: 50 kg de produto + 50 kg de sal branco.
Terminação: 50 kg do produto + 75 kg de sal branco.

Ou conforme a orientação do nutricionista.



Linha Branca

Premiphós 160



GARANTIA

Cálcio (Máx.)	260.00	g/kg
Cálcio (Mín.)	190.00	g/kg
Fósforo (Mín.)	160.00	g/kg
Enxofre (Mín.)	5000.00	mg/kg
Cobalto (Mín.)	200.00	mg/kg
Cobre (Mín.)	2000.00	mg/kg
Manganês (Mín.)	2000.00	mg/kg
Zinco (Mín.)	6000.00	mg/kg
Selênio (Mín.)	20.00	mg/kg
Iodo (Mín.)	100.00	mg/kg
Flúor (Máx.)	1600.00	mg/kg

kg: quilograma; **g:** grama; **mg:** miligrama; **UFC:** unidade formadora de colônia; **UI:** unidade internacional; **Kcal:** quilocaloria

Cria, recria e terminação.

Suplemento mineral. Este produto é produzido com matérias-primas de alta tecnologia e biodisponibilidade, proporcionando o equilíbrio nutricional.

Variável, conforme diluição.

Produto indicado para bovinos de corte, para misturar em sal branco.

Sugestões de misturas

Pastagens ou dietas de baixo valor nutricional

Cria e recria: 75 kg de produto + 50 kg de sal branco.
Terminação: 50 kg de produto + 50 kg de sal branco.

Pastagens ou dietas de médio a alto valor nutricional

Cria e recria: 50 kg de produto + 50 kg de sal branco.
Terminação: 50 kg do produto + 75 kg de sal branco.

Ou conforme a orientação do nutricionista.



Linha Branca

Premiphós 60



GARANTIA

Cálcio (Máx.)	160.00	g/kg
Cálcio (Mín.)	120.00	g/kg
Fósforo (Mín.)	60.00	g/kg
Enxofre (Mín.)	12.00	g/kg
Sódio (Mín.)	163.00	g/kg
Cobalto (Mín.)	210.00	mg/kg
Cobre (Mín.)	1600.00	mg/kg
Manganês (Mín.)	1200.00	mg/kg
Zinco (Mín.)	5000.00	mg/kg
Selênio (Mín.)	27.00	mg/kg
Iodo (Mín.)	180.00	mg/kg
Flúor (Máx.)	600.00	mg/kg

kg: quilograma; **g:** grama; **mg:** miligrama; **UFC:** unidade formadora de colônia; **UI:** unidade internacional; **Kcal:** quilocaloria

Cria e recria.

Suplemento mineral completo para bovinos. Este produto corrige desequilíbrios nutricionais de origens carenciais ou metabólicas, proporcionando aumentos produtivos e reprodutivos.

50 a 80 g/animal/dia

Produto pronto para uso, indicado para animais em qualquer tipo de pastagem. Deve ser fornecido à vontade aos animais em cocho saleiro, de preferência coberto, com uma metragem disponível de 5 a 8 cm lineares/animal ou conforme a orientação do nutricionista.



Linha Branca

Premiphós 60 20A



Cria e recria.

Suplemento mineral completo para bovinos. Este produto corrige desequilíbrios nutricionais de origens carenciais ou metabólicas, proporcionando aumentos produtivos e reprodutivos.

50 a 80 g/animal/dia

Produto pronto para uso, indicado para animais em qualquer tipo de pastagem. Deve ser fornecido à vontade aos animais em cocho saleiro, de preferência coberto, com uma metragem disponível de 5 a 8 cm lineares/animal ou conforme a orientação do nutricionista.



GARANTIA

Cálcio (Máx.)	160.00	g/kg
Cálcio (Mín.)	110.00	g/kg
Fósforo (Mín.)	60.00	g/kg
Enxofre (Mín.)	12.00	g/kg
Sódio (Mín.)	163.00	g/kg
Cobalto (Mín.)	210.00	mg/kg
Cobre (Mín.)	1600.00	mg/kg
Manganês (Mín.)	1200.00	mg/kg
Zinco (Mín.)	5000.00	mg/kg
Selênio (Mín.)	27.00	mg/kg
Iodo (Mín.)	180.00	mg/kg
Flúor (Máx.)	600.00	mg/kg
Metionina (Mín.)	170.00	mg/kg
Tirosina (Mín.)	160.00	mg/kg
Vitamina B12 (Mín.)	33.30	µg/kg
Lisina (Mín.)	680.00	mg/kg
Colina (Mín.)	60.00	mg/kg
Cromo orgânico (Mín.)	0.60	mg/kg
Zinco orgânico (Mín.)	20.78	mg/kg
Mananoligossacarídeos (Mín.)	332.64	mg/kg
Ácido Linoleico (Mín.)	297.00	mg/kg
Ácido Oleico (Mín.)	0.27	mg/kg
Bacillus subtilis (Mín.)	8.31 x 10E8	ufc/kg
Bifidobacterium bifidum (Mín.)	6.23 x 10E8	ufc/kg
Enterococcus faecium (Mín.)	6.23 x 10E8	ufc/kg
Lactobacillus acidophilus (Mín.)	6.23 x 10E8	ufc/kg
Lactobacillus casei (Mín.)	5.40 x 10E8	ufc/kg
Lactobacillus lactis (Mín.)	2.91 x 10E8	ufc/kg
Glucomananos (Mín.)	1160.00	mg/kg
Beta glucanos (Mín.)	830.00	mg/kg

kg: quilograma; **g:** grama; **mg:** miligrama; **UFC:** unidade formadora de colônia; **UI:** unidade internacional; **Kcal:** quilocaloria

Linha Branca

Premiphós 80



GARANTIA

Cálcio (Máx.)	160.00	g/kg
Cálcio (Mín.)	140.00	g/kg
Fósforo (Mín.)	80.00	g/kg
Enxofre (Mín.)	12.00	g/kg
Sódio (Mín.)	134.00	g/kg
Cobalto (Mín.)	210.00	mg/kg
Cobre (Mín.)	1600.00	mg/kg
Manganês (Mín.)	1400.00	mg/kg
Zinco (Mín.)	4500.00	mg/kg
Selênio (Mín.)	27.00	mg/kg
Iodo (Mín.)	180.00	mg/kg
Flúor (Máx.)	800.00	mg/kg

kg: quilograma; **g:** grama; **mg:** miligrama; **UFC:** unidade formadora de colônia; **UI:** unidade internacional; **Kcal:** quilocaloria

Cria, recria e terminação.

Suplemento mineral completo para bovinos. Este produto corrige desequilíbrios nutricionais de origens carenciais ou metabólicas, proporcionando aumentos produtivos e reprodutivos.

60 a 100 g/animal/dia

Produto pronto para uso, indicado para animais em fase de cria, recria e terminação em qualquer tipo de pastagem. Deve ser fornecido à vontade aos animais em cocho saleiro, de preferência coberto, com uma metragem disponível de 5 a 8 cm lineares/animal ou conforme a orientação do nutricionista.



Linha Branca

Premiphós 80 20A



Cria, recria e terminação.

Suplemento mineral completo para bovinos. Este produto corrige desequilíbrios nutricionais de origens carenciais ou metabólicas, proporcionando aumentos produtivos e reprodutivos.

60 a 100 g/animal/dia

Produto pronto para uso, indicado para animais em fase de cria, recria e terminação em qualquer tipo de pastagem. Deve ser fornecido à vontade aos animais em cocho saleiro, de preferência coberto, com uma metragem disponível de 5 a 8 cm lineares/animal ou conforme a orientação do nutricionista.



GARANTIA

Lisina (Mín.)	290.00	mg/kg
Colina (Mín.)	50.00	mg/kg
Cromo orgânico (Mín.)	0.60	mg/kg
Zinco orgânico (Mín.)	20.00	mg/kg
Mananoligossacarídeos (Mín.)	332.64	mg/kg
Ácido Linoleico (Mín.)	297.00	mg/kg
Ácido Oleico (Mín.)	0.27	mg/kg
Bacillus subtilis (Mín.)	8.31 x 10E8	ufc/kg
Bifidobacterium bifidum (Mín.)	6.23 x 10E8	ufc/kg
Enterococcus faecium (Mín.)	6.23 x 10E8	ufc/kg
Lactobacillus acidophilus (Mín.)	6.23 x 10E8	ufc/kg
Lactobacillus casei (Mín.)	5.40 x 10E8	ufc/kg
Lactobacillus lactis (Mín.)	2.91 x 10E8	ufc/kg
Glucomananos (Mín.)	1160.00	mg/kg
Beta glucanos (Mín.)	830.00	mg/kg
Cálcio (Máx.)	160.00	g/kg
Cálcio (Mín.)	125.00	g/kg
Fósforo (Mín.)	80.00	g/kg
Enxofre (Mín.)	12.00	g/kg
Sódio (Mín.)	134.00	g/kg
Cobalto (Mín.)	210.00	mg/kg
Cobre (Mín.)	1600.00	mg/kg
Manganês (Mín.)	1400.00	mg/kg
Zinco (Mín.)	4500.00	mg/kg
Selênio (Mín.)	27.00	mg/kg
Iodo (Mín.)	180.00	mg/kg
Flúor (Máx.)	800.00	mg/kg
Metionina (Mín.)	85.00	mg/kg
Tirosina (Mín.)	60.00	mg/kg
Vitamina B12 (Mín.)	33.30	µg/kg

kg: quilograma; **g:** grama; **mg:** miligrama; **UFC:** unidade formadora de colônia; **UI:** unidade internacional; **Kcal:** quilocaloria

Linha Branca

Premiphós ILP



Recria e terminação.

Suplemento mineral completo para bovinos, aditivado com Fator P. Este produto oferece alta produtividade para bovinos em pastagens provisórias no sistema de Integração Lavoura e Pecuária (agropastoril). Contém leveduras, probióticos, prebióticos, ureia protegida, adsorventes de micotoxinas e minerais orgânicos.

70 a 170g/animal/dia

Produto pronto para uso, indicado para animais em fase de recria e terminação em pastagens provisórias. Deve ser fornecido à vontade aos animais em cocho saleiro, de preferência coberto, com uma metragem disponível de 5 a 8 cm lineares/animal ou conforme a orientação do nutricionista.



GARANTIA

Proteína Bruta (Mín.)	56.00	g/kg
NNP – Equiv. Proteico (Máx.)	37.50	g/kg
Cálcio (Máx.)	160.00	g/kg
Cálcio (Mín.)	60.00	g/kg
Fósforo (Mín.)	18.00	g/kg
Enxofre (Mín.)	10.00	g/kg
Sódio (Mín.)	95.00	g/kg
Cobalto (Mín.)	150.00	mg/kg
Cobre (Mín.)	800.00	mg/kg
Zinco (Mín.)	4000.00	mg/kg
Selênio (Mín.)	27.00	mg/kg
Iodo (Mín.)	40.00	mg/kg
Flúor (Máx.)	180.00	mg/kg
Metionina (Mín.)	400.00	mg/kg
Tirosina (Mín.)	400.00	mg/kg
Saccharomyces cerevisiae (Mín.)	2.70 x 10E9	ufc/kg
Lisina (Mín.)	1700.00	mg/kg
Colina (Mín.)	1080.00	mg/kg
Cromo orgânico (Mín.)	10.00	mg/kg
Zinco orgânico (Mín.)	300.00	mg/kg
Mananligossacarídeos (Mín.)	162.00	mg/kg
Ácido Linoleico (Mín.)	54.00	mg/kg
Ácido Oleico (Mín.)	46.00	mg/kg
Adsorvente de micotoxinas (Mín.)	50.00	g/kg
Ômega 3 (Mín.)	7.90	mg/kg
Ômega 6 (Mín.)	54.00	mg/kg
Ômega 9 (Mín.)	50.76	mg/kg

kg: quilograma; **g:** grama; **mg:** miligrama; **UFC:** unidade formadora de colônia; **UI:** unidade internacional; **Kcal:** quilocaloria

Linha Branca

Premiphós Monta



Reprodução.

Suplemento mineral contendo aminoácidos para bovinos em período de monta, doadoras, receptoras de embriões, inseminação artificial e transferências de embriões. Este produto corrige desequilíbrios nutricionais de origens carenciais ou metabólicas, proporcionando melhores condições reprodutivas e melhor resposta imunológica.

80 a 130 g/animal/dia.

Produto pronto para uso, indicado para fêmeas em reprodução. Deve ser fornecido à vontade aos animais em cocho saleiro, de preferência coberto, com uma metragem disponível de 5 a 8 cm lineares / animal ou conforme a orientação do nutricionista.



GARANTIA

Cálcio (Máx.)	200.00	g/kg
Cálcio (Mín.)	140.00	g/kg
Fósforo (Mín.)	80.00	g/kg
Magnésio (Mín.)	7000.00	mg/kg
Enxofre (Mín.)	16.00	g/kg
Sódio (Mín.)	99.00	g/kg
Cobalto (Mín.)	180.00	mg/kg
Cobre (Mín.)	2800.00	mg/kg
Manganês (Mín.)	1480.00	mg/kg
Zinco (Mín.)	4180.00	mg/kg
Selênio (Mín.)	38.00	mg/kg
Iodo (Mín.)	200.00	mg/kg
Flúor (Máx.)	800.00	mg/kg
Metionina (Mín.)	140.00	mg/kg
Tirosina (Mín.)	200.00	mg/kg
Lisina (Mín.)	700.00	mg/kg
Cromo orgânico (Mín.)	10.00	mg/kg

kg: quilograma; **g:** grama; **mg:** miligrama; **UFC:** unidade formadora de colônia; **UI:** unidade internacional; **Kcal:** quilocaloria

Linha Branca

Premiphós Monta Fator P



Reprodução.

Suplemento mineral contendo aminoácidos para bovinos em período de monta, doadoras, receptoras de embriões, inseminação artificial e transferências de embriões. Este produto corrige desequilíbrios nutricionais de origens carenciais ou metabólicas, proporcionando melhores condições reprodutivas e melhor resposta imunológica.

80 a 130 g/animal/dia.

Produto pronto para uso, indicado para fêmeas em reprodução. Deve ser fornecido à vontade aos animais em cocho saleiro, de preferência coberto, com uma metragem disponível de 5 a 8 cm lineares / animal ou conforme a orientação do nutricionista



GARANTIA

Ômega 9 (Mín.)	56.40	mg/kg
Cálcio (Máx.)	160.00	g/kg
Cálcio (Mín.)	140.00	g/kg
Fósforo (Mín.)	80.00	g/kg
Magnésio (Mín.)	7000.00	mg/kg
Enxofre (Mín.)	16.00	g/kg
Sódio (Mín.)	99.00	g/kg
Cobalto (Mín.)	180.00	mg/kg
Cobre (Mín.)	2800.00	mg/kg
Manganês (Mín.)	1480.00	mg/kg
Zinco (Mín.)	4180.00	mg/kg
Selênio (Mín.)	38.00	mg/kg
Iodo (Mín.)	200.00	mg/kg
Flúor (Máx.)	800.00	mg/kg
Metionina (Mín.)	10.00	mg/kg
Tirosina (Mín.)	30.00	mg/kg
Saccharomyces cerevisiae (Mín.)	3.00 x 10E9	ufc/kg
Lisina (Mín.)	150.00	mg/kg
Colina (Mín.)	1200.00	mg/kg
Cromo orgânico (Mín.)	10.00	mg/kg
Zinco orgânico (Mín.)	31.50	mg/kg
Mananoligossacarídeos (Mín.)	180.00	mg/kg
Ácido Linoleico (Mín.)	60.39	mg/kg
Ácido Oleico (Mín.)	51.24	mg/kg
Ômega 3 (Mín.)	8.86	mg/kg
Ômega 6 (Mín.)	60.30	mg/kg

kg: quilograma; **g:** grama; **mg:** miligrama; **UFC:** unidade formadora de colônia; **UI:** unidade internacional; **Kcal:** quilocaloria

Linha Branca

Ureia 10 20A



Cria, recria e terminação.

Suplemento mineral com ureia. Produto indicado para bovinos em fase de cria, recria e terminação no período da seca, manejados em pastagens com boa disponibilidade de massa.

100 a 250 g/animal/dia

Produto pronto para uso. Com consumo podendo variar entre 100 g e 250 g/animal/dia. Deve ser fornecido à vontade aos animais em cocho saleiro, de preferência coberto, com uma metragem disponível de 5 a 8 cm lineares/animal. Animais em condições de suplementação pouco eficientes, devem ser adaptados, utilizando uma mistura crescente com suplemento mineral sem ureia, por uma semana ou conforme a orientação do nutricionista.

Esse produto contém ureia, não fornecer para equídeos.



GARANTIA

Zinco (Mín.)	2500.00	mg/kg
NNP – Equiv. Proteico (Máx.)	281.10	g/kg
Cálcio (Máx.)	140.00	g/kg
Cálcio (Mín.)	70.00	g/kg
Fósforo (Mín.)	30.00	g/kg
Enxofre (Mín.)	10.00	g/kg
Sódio (Mín.)	140.00	g/kg
Cobalto (Mín.)	80.00	mg/kg
Cobre (Mín.)	800.00	mg/kg
Manganês (Mín.)	50.00	mg/kg
Selênio (Mín.)	20.00	mg/kg
Iodo (Mín.)	70.00	mg/kg
Flúor (Máx.)	300.00	mg/kg
Metionina (Mín.)	100.00	mg/kg
Tirosina (Mín.)	100.00	mg/kg
Vitamina B12 (Mín.)	33.30	µg/kg
Ácido fumárico (Mín.)	500.00	mg/kg
Lisina (Mín.)	600.00	mg/kg
Níquel (Mín.)	4.50	mg/kg
Colina (Mín.)	140.00	mg/kg
Cromo orgânico (Mín.)	0.60	mg/kg
Zinco orgânico (Mín.)	20.78	mg/kg
Mananoligossacarídeos (Mín.)	332.64	mg/kg
Ácido Linoleico (Mín.)	297.00	mg/kg
Ácido Oleico (Mín.)	0.27	mg/kg
Bacillus subtilis (Mín.)	8.31 x 10E8	ufc/kg
Bifidobacterium bifidum (Mín.)	6.23 x 10E8	ufc/kg
Enterococcus faecium (Mín.)	6.23 x 10E8	ufc/kg
Lactobacillus acidophilus (Mín.)	6.23 x 10E8	ufc/kg
Lactobacillus casei (Mín.)	5.40 x 10E8	ufc/kg
Lactobacillus lactis (Mín.)	2.91 x 10E8	ufc/kg
Glucomananos (Mín.)	1160.00	mg/kg
Beta glucanos (Mín.)	830.00	mg/kg

kg: quilograma; **g:** grama; **mg:** miligrama; **UFC:** unidade formadora de colônia; **UI:** unidade internacional; **Kcal:** quilocaloria

Linha Branca

Ureia 15



Cria, recria e terminação.

Suplemento mineral com ureia. Este produto além de fornecer nitrogênio, corrige desequilíbrios nutricionais de origens carenciais ou metabólicas, proporcionando melhores condições digestivas de alimentos fibrosos pobres em proteína.

100 a 250 g/animal/dia

Produto pronto para uso, indicado para animais em fase de cria, recria e terminação no período da seca, manejados em pastagens com boa disponibilidade de massa. Deve ser fornecido à vontade aos animais em cocho saleiro, de preferência coberto, com uma metragem disponível de 5 a 8 cm lineares/animal. Animais em condições de suplementação pouco eficientes devem ser adaptados utilizando uma mistura crescente com suplemento mineral sem ureia por uma semana ou conforme a orientação do nutricionista.

Esse produto contém ureia, não fornecer para equídeos.

GARANTIA

Proteína Bruta (Mín.)	431.30	g/kg
NNP – Equiv. Proteico (Máx.)	431.30	g/kg
Cálcio (Máx.)	97.00	g/kg
Cálcio (Mín.)	65.00	g/kg
Fósforo (Mín.)	30.00	g/kg
Magnésio (Mín.)	4000.00	mg/kg
Enxofre (Mín.)	15.00	g/kg
Sódio (Mín.)	175.50	g/kg
Cobalto (Mín.)	80.00	mg/kg
Cobre (Mín.)	800.00	mg/kg
Manganês (Mín.)	50.00	mg/kg
Zinco (Mín.)	2500.00	mg/kg
Selênio (Mín.)	20.00	mg/kg
Iodo (Mín.)	70.00	mg/kg
Flúor (Máx.)	300.00	mg/kg
Ácido fumárico (Mín.)	500.00	mg/kg
Níquel (Mín.)	4.50	mg/kg

kg: quilograma; **g:** grama; **mg:** miligrama; **UFC:** unidade formadora de colônia; **UI:** unidade internacional; **Kcal:** quilocaloria



Linha Branca

Ureia 20



Cria, recria e terminação.

Suplemento mineral com ureia. Este produto, além de fornecer nitrogênio, corrige desequilíbrios nutricionais de origens carenciais ou metabólicas, proporcionando melhores condições digestivas de alimentos fibrosos pobres em proteína.

100 a 250 g/animal/dia

Produto pronto para uso, indicado para animais em fase de cria, recria e terminação no período da seca, manejados em pastagens com boa disponibilidade de massa. Deve ser fornecido à vontade aos animais em cocho saleiro, de preferência coberto, com uma metragem disponível de 5 a 8 cm lineares/animal. Animais em condições de suplementação pouco eficientes devem ser adaptados utilizando uma mistura crescente com suplemento mineral sem ureia por uma semana ou conforme a orientação do nutricionista.

Esse produto contém ureia, não fornecer para equídeos.

GARANTIA

Proteína Bruta (Mín.)	575.00	g/kg
NNP – Equiv. Proteico (Máx.)	575.00	g/kg
Cálcio (Máx.)	97.00	g/kg
Cálcio (Mín.)	65.00	g/kg
Fósforo (Mín.)	30.00	g/kg
Magnésio (Mín.)	4000.00	mg/kg
Enxofre (Mín.)	15.00	g/kg
Sódio (Mín.)	165.80	g/kg
Cobalto (Mín.)	80.00	mg/kg
Cobre (Mín.)	800.00	mg/kg
Manganês (Mín.)	50.00	mg/kg
Zinco (Mín.)	2500.00	mg/kg
Selênio (Mín.)	20.00	mg/kg
Iodo (Mín.)	70.00	mg/kg
Flúor (Máx.)	300.00	mg/kg
Ácido fumárico (Mín.)	500.00	mg/kg
Níquel (Mín.)	4.50	mg/kg

kg: quilograma; **g:** grama; **mg:** miligrama; **UFC:** unidade formadora de colônia; **UI:** unidade internacional; **Kcal:** quilocaloria



Linha Branca

Ureia 27



Cria, recria e terminação.

Suplemento mineral com ureia. Este produto além de fornecer nitrogênio, corrige desequilíbrios nutricionais de origens carenciais ou metabólicas, proporcionando melhores condições digestivas de alimentos fibrosos pobres em proteína.

100 a 250 g/animal/dia

Produto pronto para uso, indicado para animais em fase de cria, recria e terminação no período da seca, manejados em pastagens com boa disponibilidade de massa. Deve ser fornecido à vontade aos animais em cocho saleiro, de preferência coberto, com uma metragem disponível de 5 a 8 cm lineares/animal. Animais em condições de suplementação pouco eficientes devem ser adaptados utilizando uma mistura crescente com suplemento mineral sem ureia por uma semana ou conforme a orientação do nutricionista.

Esse produto contém ureia, não fornecer para equídeos.

GARANTIA

Proteína Bruta (Mín.)	761.00	g/kg
NNP – Equiv. Proteico (Máx.)	760.00	g/kg
Cálcio (Máx.)	140.00	g/kg
Cálcio (Mín.)	70.00	g/kg
Fósforo (Mín.)	30.00	g/kg
Enxofre (Mín.)	12.00	g/kg
Sódio (Mín.)	117.00	g/kg
Cobalto (Mín.)	80.00	mg/kg
Cobre (Mín.)	800.00	mg/kg
Manganês (Mín.)	50.00	mg/kg
Zinco (Mín.)	2500.00	mg/kg
Selênio (Mín.)	20.00	mg/kg
Iodo (Mín.)	70.00	mg/kg
Flúor (Máx.)	300.00	mg/kg
Ácido fumárico (Mín.)	500.00	mg/kg
Níquel (Mín.)	4.50	mg/kg
Colina (Mín.)	6.00	mg/kg

kg: quilograma; **g:** grama; **mg:** miligrama; **UFC:** unidade formadora de colônia; **UI:** unidade internacional; **Kcal:** quilocaloria

Linha Campo

Campo 30



GARANTIA

Sódio (Mín.)	72.00	g/kg
Cobalto (Mín.)	42.00	mg/kg
Cobre (Mín.)	228.80	mg/kg
Zinco (Mín.)	800.00	mg/kg
Selênio (Mín.)	5.00	mg/kg
Iodo (Mín.)	28.00	mg/kg
Flúor (Máx.)	150.00	mg/kg
NDT (Mín.)	300.00	g/kg
Proteína Bruta (Mín.)	300.00	g/kg
NNP – Equiv. Proteico (Máx.)	200.00	g/kg
Cálcio (Máx.)	80.00	g/kg
Cálcio (Mín.)	60.00	g/kg
Fósforo (Mín.)	15.00	g/kg
Enxofre (Mín.)	7000.00	mg/kg

kg: quilograma; **g:** grama; **mg:** miligrama; **UFC:** unidade formadora de colônia; **UI:** unidade internacional; **Kcal:** quilocaloria

Cria, recria e terminação.

Suplemento mineral proteico para bovinos. Este produto corrige desequilíbrios nutricionais nos período de transição e seco, estimulando a ingestão e digestão de alimentos fibrosos, evitando a perda de peso e favorecendo o ganho.

150 a 400 g/animal/dia

Produto indicado para todas as categorias de bovinos a pasto. Pode ser utilizado puro na dose mínima de 1 g/kg de peso vivo ou misturado a farelos energéticos (milho, sorgo e outros) na proporção de 30% do produto com 70% de farelo e fornecer 1 kg a 1,5 kg/animal/dia, com disponibilidade de uma área de cocho de 30 a 40 cm lineares por animal. Fornecer puro, à vontade, em cochos cobertos preferencialmente, ou que evitem acúmulo de água. Devem ser disponibilizados de 10 a 15 cm lineares de cocho por animal e em pastos com boa oferta de massa, ou conforme a orientação do nutricionista.

Esse produto contém ureia, não fornecer para equídeos.



Linha Campo

Campo 30 Fator P



Cria, recria e terminação.

Suplemento mineral proteico para bovinos. Este produto corrige desequilíbrios nutricionais no período de transição e seco, estimulando a ingestão e digestão de alimentos fibrosos, favorecendo o rebanho a ganhar e não perder peso.

150 a 400 g/animal/dia

Produto indicado para todas as categorias de bovinos a pasto. Pode ser utilizado puro na dose mínima de 1 g/kg de peso vivo ou misturado a farelos energéticos (milho, sorgo e outros) na proporção de 30% do produto com 70% de farelo e fornecer 1 kg a 1,5 kg/animal/dia, com disponibilidade de uma área de cocho de 30 a 40 cm lineares por animal. Fornecer puro, à vontade, em cochos cobertos preferencialmente, ou que evitem acúmulo de água. Devem ser disponibilizados de 10 a 15 cm lineares de cocho por animal e em pastos com boa oferta de massa, ou conforme a orientação do nutricionista.

Esse produto contém ureia, não fornecer para equídeos.



GARANTIA

Sódio (Mín.)	72.00	g/kg
Cobalto (Mín.)	42.00	mg/kg
Cobre (Mín.)	228.80	mg/kg
Zinco (Mín.)	800.00	mg/kg
Selênio (Mín.)	5.00	mg/kg
Iodo (Mín.)	28.00	mg/kg
Flúor (Máx.)	150.00	mg/kg
Metionina (Mín.)	5.10	mg/kg
Tirosina (Mín.)	12.00	mg/kg
Saccharomyces cerevisiae (Mín.)	1.26 x 10E9	ufc/kg
Lisina (Mín.)	63.00	mg/kg
Colina (Mín.)	500.00	mg/kg
Cromo orgânico (Mín.)	0.63	mg/kg
Zinco orgânico (Mín.)	13.20	mg/kg
Mananoligossacarídeos (Mín.)	75.60	mg/kg
Ácido Linoleico (Mín.)	25.36	mg/kg
Ácido Oleico (Mín.)	21.52	mg/kg
Ômega 3 (Mín.)	3.72	mg/kg
Ômega 6 (Mín.)	25.36	mg/kg
Ômega 9 (Mín.)	23.68	mg/kg
NDT (Mín.)	300.00	g/kg
Proteína Bruta (Mín.)	300.00	g/kg
NNP – Equiv. Proteico (Máx.)	200.00	g/kg
Cálcio (Máx.)	80.00	g/kg
Cálcio (Mín.)	60.00	g/kg
Fósforo (Mín.)	15.00	g/kg
Enxofre (Mín.)	6000.00	mg/kg

kg: quilograma; **g:** grama; **mg:** miligrama; **UFC:** unidade formadora de colônia; **UI:** unidade internacional; **Kcal:** quilocaloria

Linha Campo

Campo 50



GARANTIA

Proteína Bruta (Mín.)	500.00	g/kg
NDT (Mín.)	300.00	g/kg
NNP – Equiv. Proteico (Máx.)	390.00	g/kg
Cálcio (Máx.)	80.00	g/kg
Cálcio (Mín.)	60.00	g/kg
Fósforo (Mín.)	20.00	g/kg
Enxofre (Mín.)	6000.00	mg/kg
Sódio (Mín.)	90.00	g/kg
Cobalto (Mín.)	42.00	mg/kg
Cobre (Mín.)	228.80	mg/kg
Zinco (Mín.)	800.00	mg/kg
Selênio (Mín.)	5.00	mg/kg
Iodo (Mín.)	28.00	mg/kg
Flúor (Máx.)	200.00	mg/kg

kg: quilograma; **g:** grama; **mg:** miligrama; **UFC:** unidade formadora de colônia; **UI:** unidade internacional; **Kcal:** quilocaloria

Cria, recria e terminação.

Suplemento mineral proteico para bovinos. Este produto corrige desequilíbrios nutricionais no período seco, estimulando a ingestão e digestão de alimentos fibrosos, evitando a perda de peso e favorecendo o ganho.

180 a 450 g/animal/dia

Produto indicado para todas as categorias de bovinos a pasto. Pode ser utilizado puro na dose mínima de 1 g/kg de peso vivo ou misturado a farelos energéticos (milho, sorgo e outros) na proporção de 30% do produto com 70% de farelo e fornecer 1 kg a 1,5 kg/animal/dia, com disponibilidade de uma área de cocho de 30 a 40 cm lineares por animal. Fornecer puro, à vontade, em cochos cobertos preferencialmente, ou que evitem acúmulo de água. Devem ser disponibilizados de 10 a 15 cm lineares de cocho por animal e em pastos com boa oferta de massa, ou conforme a orientação do nutricionista.

Esse produto contém ureia, não fornecer para equídeos.



Linha Campo

Campo 50 Fator P



Cria, recria e terminação.

Suplemento mineral proteico para bovinos aditivado com Fator P. Este produto corrige desequilíbrios nutricionais no período seco, estimulando a ingestão e digestão de alimentos fibrosos, evitando a perda de peso e favorecendo o ganho.

180 a 450 g/animal/dia

Produto indicado para todas as categorias de bovinos a pasto. Pode ser utilizado puro na dose mínima de 1 g/kg de peso vivo ou misturado a farelos energéticos (milho, sorgo e outros) na proporção de 30% do produto com 70% de farelo e fornecer 1 kg a 1,5 kg/animal/dia, com disponibilidade de uma área de cocho de 30 a 40 cm lineares por animal. Fornecer puro, à vontade, em cochos cobertos preferencialmente, ou que evitem acúmulo de água. Devem ser disponibilizados de 10 a 15 cm lineares de cocho por animal e em pastos com boa oferta de massa, ou conforme a orientação do nutricionista.

Esse produto contém ureia, não fornecer para equídeos.



GARANTIA

Ácido Linoleico (Mín.)	23.55	mg/kg
Ácido Oleico (Mín.)	19.98	mg/kg
Ômega 3 (Mín.)	3.45	mg/kg
Ômega 6 (Mín.)	23.55	mg/kg
Ômega 9 (Mín.)	21.90	mg/kg
Fator P (Mín.)	11.70	g/kg
NDT (Mín.)	300.00	g/kg
Proteína Bruta (Mín.)	500.00	g/kg
NNP – Equiv. Proteico (Máx.)	390.00	g/kg
Cálcio (Máx.)	80.00	g/kg
Cálcio (Mín.)	60.00	g/kg
Fósforo (Mín.)	20.00	g/kg
Enxofre (Mín.)	6000.00	mg/kg
Sódio (Mín.)	90.00	g/kg
Cobalto (Mín.)	42.00	mg/kg
Cobre (Mín.)	228.80	mg/kg
Zinco (Mín.)	800.00	mg/kg
Selênio (Mín.)	5.00	mg/kg
Iodo (Mín.)	28.00	mg/kg
Flúor (Máx.)	200.00	mg/kg
Metionina (Mín.)	5.10	mg/kg
Tirosina (Mín.)	12.00	mg/kg
Saccharomyces cerevisiae (Mín.)	1.17 x 10E9	ufc/kg
Lisina (Mín.)	63.00	mg/kg
Colina (Mín.)	468.00	mg/kg
Cromo orgânico (Mín.)	0.58	mg/kg
Zinco orgânico (Mín.)	12.20	mg/kg
Mananoligossacarídeos (Mín.)	70.20	mg/kg

kg: quilograma; **g:** grama; **mg:** miligrama; **UFC:** unidade formadora de colônia; **UI:** unidade internacional; **Kcal:** quilocaloria

Linha Campo

Campo Águas



GARANTIA

Cobre (Mín.)	1440.00	mg/kg
Zinco (Mín.)	2500.00	mg/kg
Selênio (Mín.)	9.00	mg/kg
Iodo (Mín.)	120.00	mg/kg
Flúor (Máx.)	340.00	mg/kg
Tirosina (Mín.)	1000.00	mg/kg
Ácido fumárico (Mín.)	2900.00	mg/kg
NDT (Mín.)	280.00	g/kg
Proteína Bruta (Mín.)	100.00	g/kg
NNP – Equiv. Proteico (Máx.)	45.00	g/kg
Cálcio (Máx.)	100.00	g/kg
Cálcio (Mín.)	70.00	g/kg
Fósforo (Mín.)	34.00	g/kg
Enxofre (Mín.)	30.00	g/kg
Sódio (Mín.)	100.00	g/kg
Cobalto (Mín.)	168.00	mg/kg

kg: quilograma; **g:** grama; **mg:** miligrama; **UFC:** unidade formadora de colônia; **UI:** unidade internacional; **Kcal:** quilocaloria

Recria e terminação.

Suplemento mineral para bovinos. Este produto corrige desequilíbrios nutricionais e potencializa a degradação da fração fibrosa, disponibilizando mais energia, além de aumentar a utilização de nitrogênio das forrageiras verdes no período das águas.

100 a 300 g/animal/dia

Produto indicado para animais de recria e terminação, nos mais variados tipos de pastagens com boa disponibilidade de massa. Pode ser utilizado puro ou misturado em farelos energéticos (milho, sorgo e outros) na proporção de 20% do produto com 80% de farelo e fornecer 1 kg a 1,5 kg/animal/dia, com disponibilidade de uma área de cocho de 30 a 40 cm lineares por animal. Fornecer puro, à vontade, em cochos cobertos preferencialmente, ou que evitem acúmulo de água. Deve ser disponibilizado de 10 a 15 cm lineares de cocho por animal e em pastos com boa oferta de massa, ou conforme a orientação do nutricionista.

Esse produto contém ureia, não fornecer para equídeos.



Linha Campo

Campo Águas 20 A



Recria e terminação.

Suplemento mineral para bovinos. Este produto corrige desequilíbrios nutricionais e potencializa a degradação da fração fibrosa, disponibilizando mais energia, além de aumentar a utilização de nitrogênio das forrageiras verdes no período das águas.

100 a 300 g/animal/dia

Produto indicado para animais de recria e terminação, nos mais variados tipos de pastagens com boa disponibilidade de massa. Pode ser utilizado puro ou misturado em farelos energéticos (milho, sorgo e outros) na proporção de 20% do produto com 80% de farelo e fornecer 1 kg a 1,5 kg/animal/dia, com disponibilidade de uma área de cocho de 30 a 40 cm lineares por animal. Fornecer puro, à vontade, em cochinhos cobertos preferencialmente, ou que evitem acúmulo de água. Deve ser disponibilizado de 10 a 15 cm lineares de cocho por animal e em pastos com boa oferta de massa, ou conforme a orientação do nutricionista.

Esse produto contém ureia, não fornecer para eqüídeos.



GARANTIA

Ácido Linoleico (Mín.)	222.75	mg/kg
Ácido Oleico (Mín.)	0.20	mg/kg
Bacillus subtilis (Mín.)	6.23 x 10E8	ufc/kg
NDT (Mín.)	280.00	g/kg
Proteína Bruta (Mín.)	100.00	g/kg
NNP – Equiv. Proteico (Máx.)	45.00	g/kg
Cálcio (Máx.)	100.00	g/kg
Cálcio (Mín.)	70.00	g/kg
Fósforo (Mín.)	34.00	g/kg
Enxofre (Mín.)	30.00	g/kg
Sódio (Mín.)	100.00	g/kg
Cobalto (Mín.)	168.00	mg/kg
Cobre (Mín.)	1440.00	mg/kg
Zinco (Mín.)	2500.00	mg/kg
Selênio (Mín.)	9.00	mg/kg
Iodo (Mín.)	120.00	mg/kg
Flúor (Máx.)	340.00	mg/kg
Metionina (Mín.)	100.00	mg/kg
Tirosina (Mín.)	100.00	mg/kg
Vitamina B12 (Mín.)	24.97	µg/kg
Ácido fumárico (Mín.)	2900.00	mg/kg
Lisina (Mín.)	500.00	mg/kg
Colina (Mín.)	40.00	mg/kg
Cromo orgânico (Mín.)	0.44	mg/kg
Zinco orgânico (Mín.)	15.59	mg/kg
Mananligossacarídeos (Mín.)	249.48	mg/kg
Bifidobacterium bifidum (Mín.)	4.67 x 10E8	ufc/kg
Enterococcus faecium (Mín.)	4.67 x 10E8	ufc/kg
Lactobacillus acidophilus (Mín.)	4.67 x 10E8	ufc/kg
Lactobacillus casei (Mín.)	4.05 x 10E8	ufc/kg
Lactobacillus lactis (Mín.)	2.18 x 10E8	ufc/kg
Glucomananos (Mín.)	870.00	mg/kg
Beta glucanos (Mín.)	620.00	mg/kg

kg: quilograma; g: grama; mg: miligrama; UFC: unidade formadora de colônia; UI: unidade internacional; Kcal: quilocaloria

Linha Campo

Campo Águas Fator P



Recria e terminação.

Suplemento mineral para bovinos. Este produto corrige desequilíbrios nutricionais e potencializa a degradação da fração fibrosa, disponibilizando mais energia, além de aumentar a utilização de nitrogênio das forrageiras verdes no período das águas.

100 a 300 g/animal/dia

Produto indicado para animais de recria e terminação, nos mais variados tipos de pastagens com boa disponibilidade de massa. Pode ser utilizado puro ou misturado em farelos energéticos (milho, sorgo e outros) na proporção de 20% do produto com 80% de farelo e fornecer 1 kg a 1,5 kg/animal/dia, com disponibilidade de uma área de cocho de 30 a 40 cm lineares por animal. Fornecer puro, à vontade, em cochos cobertos preferencialmente, ou que evitem acúmulo de água. Deve ser disponibilizado de 10 a 15 cm lineares de cocho por animal e em pastos com boa oferta de massa, ou conforme a orientação do nutricionista.

Esse produto contém ureia, não fornecer para eqüídeos.



GARANTIA

NDT (Mín.)	280.00	g/kg
Proteína Bruta (Mín.)	100.00	g/kg
NNP – Equiv. Proteico (Máx.)	45.00	g/kg
Cálcio (Máx.)	100.00	g/kg
Cálcio (Mín.)	70.00	g/kg
Fósforo (Mín.)	34.00	g/kg
Enxofre (Mín.)	30.00	g/kg
Sódio (Mín.)	100.00	g/kg
Cobalto (Mín.)	168.00	mg/kg
Cobre (Mín.)	1440.00	mg/kg
Zinco (Mín.)	2500.00	mg/kg
Selênio (Mín.)	9.00	mg/kg
Iodo (Mín.)	120.00	mg/kg
Flúor (Máx.)	340.00	mg/kg
Metionina (Mín.)	5.00	mg/kg
Tirosina (Mín.)	12.00	mg/kg
Ácido fumárico (Mín.)	2900.00	mg/kg
Saccharomyces cerevisiae (Mín.)	2.00 x 10E9	ufc/kg
Lisina (Mín.)	63.00	mg/kg
Colina (Mín.)	800.00	mg/kg
Cromo orgânico (Mín.)	0.90	mg/kg
Zinco orgânico (Mín.)	21.00	mg/kg
Mananligossacarídeos (Mín.)	120.00	mg/kg
Ácido Linoleico (Mín.)	40.26	mg/kg
Ácido Oleico (Mín.)	34.16	mg/kg
Ômega 3 (Mín.)	5.90	mg/kg
Ômega 6 (Mín.)	40.26	mg/kg
Ômega 9 (Mín.)	37.60	mg/kg
Fator P (Mín.)	20.00	g/kg

kg: quilograma; **g:** grama; **mg:** miligrama; **UFC:** unidade formadora de colônia; **UI:** unidade internacional; **Kcal:** quilocaloria

Linha Campo

Campo Creep Feeding



Cria.

Suplemento mineral proteico para bovinos. Este produto estimula o desenvolvimento e o metabolismo ruminal de bezerros, proporcionando maior peso à desmama e/ou ao fazer a desmama precoce.

O consumo pode iniciar em 15 g chegando a 500 g/animal/dia, dependendo das condições de lactação das matrizes; ou misturado em farelos energéticos (milho, sorgo e outros) na proporção de 50% do produto com 50% de farelo e fornecer de 0,5 kg a 1 kg/animal/dia, ou conforme a orientação do nutricionista.

Pode ser utilizado puro, à vontade, em cochos privativos para bezerro (creep-feeding). Produto indicado para animais a partir dos primeiros dias de vida (bezerro ao pé) até os 8 meses de idade.

Esse produto contém ureia, não fornecer para equídeos.



GARANTIA

NDT (Mín.)	620.00	g/kg
Proteína Bruta (Mín.)	250.00	g/kg
NNP – Equiv. Proteico (Máx.)	100.00	g/kg
Cálcio (Máx.)	50.00	g/kg
Cálcio (Mín.)	30.00	g/kg
Fósforo (Mín.)	9000.00	mg/kg
Enxofre (Mín.)	2000.00	mg/kg
Sódio (Mín.)	7600.00	mg/kg
Cobalto (Mín.)	10.00	mg/kg
Cobre (Mín.)	80.00	mg/kg
Zinco (Mín.)	1550.00	mg/kg
Selênio (Mín.)	0.55	mg/kg
Iodo (Mín.)	14.00	mg/kg
Flúor (Máx.)	90.00	mg/kg
Saccharomyces cerevisiae (Mín.)	3.20 x 10E7	ufc/kg
Colina (Mín.)	6.00	mg/kg
Cromo orgânico (Mín.)	10.00	mg/kg
Zinco orgânico (Mín.)	48.75	mg/kg
Mananoligossacarídeos (Mín.)	780.00	mg/kg
Bacillus subtilis (Mín.)	7.50 x 10E8	ufc/kg
Bifidobacterium bifidum (Mín.)	5.63 x 10E8	ufc/kg
Enterococcus faecium (Mín.)	5.63 x 10E8	ufc/kg
Lactobacillus acidophilus (Mín.)	5.63 x 10E8	ufc/kg
Lactobacillus casei (Mín.)	4.88 x 10E8	ufc/kg
Lactobacillus lactis (Mín.)	2.63 x 10E8	ufc/kg

kg: quilograma; g: grama; mg: miligrama; UFC: unidade formadora de colônia; UI: unidade internacional; Kcal: quilocaloria

Linha Campo

Campo Creep Feeding Fator P



Cria.

Suplemento mineral proteico para bovinos. Este produto estimula o desenvolvimento e o metabolismo ruminal de bezerros, proporcionando maior peso à desmama e/ou ao fazer a desmama precoce.

O consumo pode iniciar em 15 g chegando a 500 g/animal/dia, dependendo das condições de lactação das matrizes; ou misturado em farelos energéticos (milho, sorgo e outros) na proporção de 50% do produto com 50% de farelo e fornecer de 0,5 kg a 1 kg/animal/dia, ou conforme a orientação do nutricionista.

Pode ser utilizado puro, à vontade, em cochos privativos para bezerro (creep-feeding). Produto indicado para animais a partir dos primeiros dias de vida (bezerro ao pé) até os 8 meses de idade.

Esse produto contém ureia, não fornecer para equídeos.



GARANTIA

NDT (Mín.)	620.00	g/kg
Proteína Bruta (Mín.)	250.00	g/kg
NNP – Equiv. Proteico (Máx.)	100.00	g/kg
Cálcio (Máx.)	50.00	g/kg
Cálcio (Mín.)	30.00	g/kg
Fósforo (Mín.)	9000.00	mg/kg
Enxofre (Mín.)	2000.00	mg/kg
Sódio (Mín.)	7600.00	mg/kg
Cobalto (Mín.)	10.00	mg/kg
Cobre (Mín.)	80.00	mg/kg
Zinco (Mín.)	1550.00	mg/kg
Selênio (Mín.)	0.07	mg/kg
Iodo (Mín.)	14.00	mg/kg
Flúor (Máx.)	90.00	mg/kg
Metionina (Mín.)	10.00	mg/kg
Tirosina (Mín.)	29.00	mg/kg
Saccharomyces cerevisiae (Mín.)	2.90 x 10E9	ufc/kg
Lisina (Mín.)	145.00	mg/kg
Colina (Mín.)	1160.00	mg/kg
Cromo orgânico (Mín.)	10.00	mg/kg
Zinco orgânico (Mín.)	30.00	mg/kg
Mananligossacarídeos (Mín.)	174.00	mg/kg
Ácido Linoleico (Mín.)	58.37	mg/kg
Ácido Oleico (Mín.)	49.53	mg/kg
Bacillus subtilis (Mín.)	7.50 x 10E8	ufc/kg
Bifidobacterium bifidum (Mín.)	5.63 x 10E8	ufc/kg
Enterococcus faecium (Mín.)	5.63 x 10E8	ufc/kg
Lactobacillus acidophilus (Mín.)	5.63 x 10E8	ufc/kg
Lactobacillus casei (Mín.)	4.88 x 10E8	ufc/kg
Lactobacillus lactis (Mín.)	2.63 x 10E8	ufc/kg
Ômega 3 (Mín.)	8.56	mg/kg
Ômega 6 (Mín.)	58.37	mg/kg
Ômega 9 (Mín.)	54.52	mg/kg
Fator P (Mín.)	29.00	g/kg

kg: quilograma; g: grama; mg: miligrama; UFC: unidade formadora de colônia; UI: unidade internacional; Kcal: quilocaloria

Linha Campo

Campo Cromo Águas 200



Recria e terminação.

Suplemento mineral proteico para bovinos. Este produto corrige desequilíbrios nutricionais e potencializa a degradação da fração fibrosa, disponibilizando mais energia, além de aumentar a utilização de nitrogênio das forrageiras verdes no período das águas.

150 a 250 g/animal/dia

Produto indicado para suplementação mineral de bovinos em recria e terminação durante o período de águas. Aditivado com melhorador de desempenho e com combinação de diferentes fontes de NNP (Ureia e Ureia de liberação lenta).

Fornecer puro, à vontade, em cochos cobertos preferencialmente, ou que evitem acúmulo de água. Deve ser disponibilizado de 10 a 15 cm lineares de cocho por animal e em pastos com boa oferta de massa, ou conforme a orientação do nutricionista.

Esse produto contém ureia, não fornecer para equídeos.

GARANTIA

NDT (Mín.)	100.00	g/kg
Proteína Bruta (Mín.)	200.00	g/kg
NNP – Equiv. Proteico (Máx.)	163.00	g/kg
Cálcio (Máx.)	200.00	g/kg
Cálcio (Mín.)	100.00	g/kg
Fósforo (Mín.)	40.00	g/kg
Magnésio (Mín.)	5000.00	mg/kg
Enxofre (Mín.)	20.00	g/kg
Sódio (Mín.)	100.00	g/kg
Cobalto (Mín.)	70.00	mg/kg
Cobre (Mín.)	675.00	mg/kg
Manganês (Mín.)	520.00	mg/kg
Zinco (Mín.)	2500.00	mg/kg
Selênio (Mín.)	13.00	mg/kg
Iodo (Mín.)	50.00	mg/kg
Flúor (Máx.)	400.00	mg/kg
Salinomicina (Mín.)	600.00	mg/kg
Cromo orgânico (Mín.)	4.00	mg/kg

kg: quilograma; **g:** grama; **mg:** miligrama; **UFC:** unidade formadora de colônia; **UI:** unidade internacional; **Kcal:** quilocaloria



Linha Campo

Campo Extra



Recria e terminação.

Suplemento mineral proteico para bovinos. Este produto corrige desequilíbrios minerais, proteicos e energéticos nos períodos pré-seca (sementeira) e na transição de secas para águas (rebrota), com o objetivo de dar continuidade ao ganho de peso de bovinos a pasto.

300 a 700 g/animal/dia

Produto indicado para animais de recria e terminação, manejados em pastagens com boa disponibilidade de massa. Pode ser utilizado puro na dose mínima de 1 g/kg de peso vivo ou misturado a farelos energéticos (milho, sorgo e outros) na proporção de 30% do produto com 70% de farelo e fornecer 1 kg a 1,5 kg/animal/dia, com disponibilidade de uma área de cocho de 30 a 40 cm lineares por animal. Fornecer puro, à vontade, em cochos cobertos preferencialmente, ou que evitem acúmulo de água. Devem ser disponibilizados de 10 a 15 cm lineares de cocho por animal e em pastos com boa oferta de massa, ou conforme a orientação do nutricionista.

Esse produto contém ureia, não fornecer para equídeos.

GARANTIA

NDT (Mín.)	400.00	g/kg
Proteína Bruta (Mín.)	350.00	g/kg
NNP – Equiv. Proteico (Máx.)	196.00	g/kg
Cálcio (Máx.)	60.00	g/kg
Cálcio (Mín.)	45.00	g/kg
Fósforo (Mín.)	15.00	g/kg
Enxofre (Mín.)	5000.00	mg/kg
Sódio (Mín.)	65.00	g/kg
Cobalto (Mín.)	10.00	mg/kg
Cobre (Mín.)	155.00	mg/kg
Zinco (Mín.)	440.00	mg/kg
Selênio (Mín.)	7.00	mg/kg
Iodo (Mín.)	14.00	mg/kg
Flúor (Máx.)	150.00	mg/kg
Metionina (Mín.)	1050.00	mg/kg
Tirosina (Mín.)	1600.00	mg/kg
Lisina (Mín.)	2000.00	mg/kg

kg: quilograma; **g:** grama; **mg:** miligrama; **UFC:** unidade formadora de colônia; **UI:** unidade internacional; **Kcal:** quilocaloria



Linha Campo

Campo Extra Fator P



Recria e terminação.

Suplemento mineral proteico para bovinos. Este produto corrige desequilíbrios minerais, proteicos e energéticos nos períodos pré-seca (sementeira) e na transição de secas para águas (rebrotas), com o objetivo de dar continuidade ao ganho de peso de bovinos a pasto.

300 a 700 g/animal/dia

Produto indicado para animais de recria e terminação, manejados em pastagens com boa disponibilidade de massa. Pode ser utilizado puro na dose mínima de 1 g/kg de peso vivo ou misturado a farelos energéticos (milho, sorgo e outros) na proporção de 30% do produto com 70% de farelo e fornecer 1 kg a 1,5 kg/animal/dia, com disponibilidade de uma área de cocho de 30 a 40 cm lineares por animal. Fornecer puro, à vontade, em cochos cobertos preferencialmente, ou que evitem acúmulo de água. Devem ser disponibilizados de 10 a 15 cm lineares de cocho por animal e em pastos com boa oferta de massa, ou conforme a orientação do nutricionista.

Esse produto contém ureia, não fornecer para equídeos.



GARANTIA

NDT (Mín.)	420.00	g/kg
Proteína Bruta (Mín.)	350.00	g/kg
NNP – Equiv. Proteico (Máx.)	196.00	g/kg
Cálcio (Máx.)	60.00	g/kg
Cálcio (Mín.)	45.00	g/kg
Fósforo (Mín.)	15.00	g/kg
Enxofre (Mín.)	5000.00	mg/kg
Sódio (Mín.)	65.00	g/kg
Cobalto (Mín.)	10.00	mg/kg
Cobre (Mín.)	155.00	mg/kg
Zinco (Mín.)	440.00	mg/kg
Selênio (Mín.)	7.00	mg/kg
Iodo (Mín.)	14.00	mg/kg
Flúor (Máx.)	150.00	mg/kg
Metionina (Mín.)	5.00	mg/kg
Tirosina (Mín.)	12.50	mg/kg
Saccharomyces cerevisiae (Mín.)	1.25 x 10E9	ufc/kg
Lisina (Mín.)	62.50	mg/kg
Colina (Mín.)	496.00	mg/kg
Cromo orgânico (Mín.)	0.60	mg/kg
Zinco orgânico (Mín.)	13.00	mg/kg
Mananoligossacarídeos (Mín.)	75.00	mg/kg
Ácido Linoleico (Mín.)	25.16	mg/kg
Ácido Oleico (Mín.)	21.35	mg/kg
Ômega 3 (Mín.)	3.69	mg/kg
Ômega 6 (Mín.)	25.16	mg/kg
Ômega 9 (Mín.)	23.50	mg/kg

kg: quilograma; **g:** grama; **mg:** miligrama; **UFC:** unidade formadora de colônia; **UI:** unidade internacional; **Kcal:** quilocaloria

Linha Campo

Campo Pré-Monta



Reprodução.

Suplemento mineral para bovinos. Este produto é enriquecido com minerais orgânicos e leveduras, proporcionando uma energia extra para fêmeas em reprodução e maior número de prenhez.

150 a 300 g/animal/dia

Produto indicado para fêmeas em reprodução. Pode ser utilizado puro ou misturado em farelos energéticos (milho, sorgo e outros) na proporção de 30% do produto com 70% de farelo e fornecer 1 kg/animal/dia com disponibilidade de uma área de cocho de 30 a 40 cm lineares por animal. Fornecer puro, à vontade, em cochões cobertos preferencialmente, ou que evitem acúmulo de água. Devem ser disponibilizados de 10 a 15 cm lineares de cocho por animal e em pastos com boa oferta de massa.

Esse produto contém ureia, não fornecer para equídeos.



GARANTIA

Cálcio (Máx.)	80.00	g/kg
Cálcio (Mín.)	70.00	g/kg
Fósforo (Mín.)	40.00	g/kg
Magnésio (Mín.)	3500.00	mg/kg
Enxofre (Mín.)	30.00	g/kg
Sódio (Mín.)	95.00	g/kg
Cobalto (Mín.)	170.00	mg/kg
Cobre (Mín.)	1440.00	mg/kg
Manganês (Mín.)	500.00	mg/kg
Zinco (Mín.)	2100.00	mg/kg
Selênio (Mín.)	18.00	mg/kg
Iodo (Mín.)	180.00	mg/kg
Flúor (Máx.)	400.00	mg/kg
Metionina (Mín.)	850.00	mg/kg
Tirosina (Mín.)	650.00	mg/kg
Selênio orgânico (Mín.)	0.50	mg/kg
Ácido fumárico (Mín.)	3000.00	mg/kg
Cromo orgânico (Mín.)	20.00	mg/kg
Bacillus subtilis (Mín.)	1.25 x 10E8	ufc/kg
Bifidobacterium bifidum (Mín.)	9.38 x 10E7	ufc/kg
Enterococcus faecium (Mín.)	9.38 x 10E7	ufc/kg
Lactobacillus acidophilus (Mín.)	9.38 x 10E7	ufc/kg
Lactobacillus casei (Mín.)	8.13 x 10E7	ufc/kg
Lactobacillus lactis (Mín.)	4.38 x 10E7	ufc/kg
NDT (Mín.)	300.00	g/kg
Proteína Bruta (Mín.)	120.00	g/kg
NNP – Equiv. Proteico (Máx.)	28.01	g/kg

kg: quilograma; **g:** grama; **mg:** miligrama; **UFC:** unidade formadora de colônia; **UI:** unidade internacional; **Kcal:** quilocaloria

Linha Campo

Campo Pré-Monta Fator P



Reprodução.

Suplemento mineral para bovinos. Este produto é enriquecido com minerais orgânicos e leveduras, proporcionando uma energia extra para fêmeas em reprodução e maior número de prenhez.

150 a 300 g/animal/dia

Produto indicado para fêmeas em reprodução. Pode ser utilizado puro ou misturado em farelos energéticos (milho, sorgo e outros) na proporção de 30% do produto com 70% de farelo e fornecer 1 kg/animal/dia com disponibilidade de uma área de cocho de 30 a 40 cm lineares por animal. Fornecer puro, à vontade, em cochinhos cobertos preferencialmente, ou que evitem acúmulo de água. Devem ser disponibilizados de 10 a 15 cm lineares de cocho por animal e em pastos com boa oferta de massa.

Esse produto contém ureia, não fornecer para equídeos



GARANTIA

Selênio (Mín.)	18.00	mg/kg
Iodo (Mín.)	180.00	mg/kg
Flúor (Máx.)	400.00	mg/kg
Metionina (Mín.)	850.00	mg/kg
Tirosina (Mín.)	650.00	mg/kg
Selênio orgânico (Mín.)	0.50	mg/kg
Ácido fumárico (Mín.)	3000.00	mg/kg
Saccharomyces cerevisiae (Mín.)	1.26 x 10E9	ufc/kg
Lisina (Mín.)	63.00	mg/kg
Colina (Mín.)	500.00	mg/kg
Cromo orgânico (Mín.)	20.00	mg/kg
Zinco orgânico (Mín.)	13.00	mg/kg
Mananoligossacarídeos (Mín.)	75.60	mg/kg
Ácido Linoleico (Mín.)	25.36	mg/kg
Ácido Oleico (Mín.)	21.52	mg/kg
Bacillus subtilis (Mín.)	1.25 x 10E8	ufc/kg
Bifidobacterium bifidum (Mín.)	9.38 x 10E7	ufc/kg
Enterococcus faecium (Mín.)	9.38 x 10E7	ufc/kg
Lactobacillus acidophilus (Mín.)	9.38 x 10E7	ufc/kg
Lactobacillus casei (Mín.)	8.13 x 10E7	ufc/kg
Lactobacillus lactis (Mín.)	4.38 x 10E7	ufc/kg
NDT (Mín.)	300.00	g/kg
Proteína Bruta (Mín.)	120.00	g/kg
NNP – Equiv. Proteico (Máx.)	28.01	g/kg
Cálcio (Máx.)	80.00	g/kg
Cálcio (Mín.)	70.00	g/kg
Fósforo (Mín.)	40.00	g/kg
Magnésio (Mín.)	3500.00	mg/kg
Enxofre (Mín.)	30.00	g/kg
Sódio (Mín.)	95.00	g/kg
Cobalto (Mín.)	170.00	mg/kg
Cobre (Mín.)	1440.00	mg/kg
Manganês (Mín.)	500.00	mg/kg
Zinco (Mín.)	2100.00	mg/kg
Ômega 3 (Mín.)	3.72	mg/kg
Ômega 6 (Mín.)	25.36	mg/kg
Ômega 9 (Mín.)	23.68	mg/kg

kg: quilograma; g: grama; mg: miligrama; UFC: unidade formadora de colônia; UI: unidade internacional; Kcal: quilocaloria

Linha Campo

Campo Seca



GARANTIA

NDT (Mín.)	300.00	g/kg
Proteína Bruta (Mín.)	400.00	g/kg
NNP – Equiv. Proteico (Máx.)	330.00	g/kg
Cálcio (Máx.)	100.00	g/kg
Cálcio (Mín.)	60.00	g/kg
Fósforo (Mín.)	15.00	g/kg
Enxofre (Mín.)	6000.00	mg/kg
Sódio (Mín.)	70.00	g/kg
Cobalto (Mín.)	25.00	mg/kg
Cobre (Mín.)	134.00	mg/kg
Zinco (Mín.)	467.00	mg/kg
Selênio (Mín.)	3.00	mg/kg
Iodo (Mín.)	16.60	mg/kg
Flúor (Máx.)	150.00	mg/kg

kg: quilograma; **g:** grama; **mg:** miligrama; **UFC:** unidade formadora de colônia; **UI:** unidade internacional; **Kcal:** quilocaloria

Cria, recria e terminação.

Suplemento mineral proteico para bovinos. Este produto corrige desequilíbrios nutricionais no período seco, estimulando a ingestão e digestão de alimentos fibrosos, favorecendo o rebanho a ganhar e não perder peso.

200 a 500 g/animal/dia

Produto indicado para todas as categorias de bovinos a pasto. Pode ser utilizado puro na dose mínima de 0,8 g/kg de peso vivo ou misturado a farelos energéticos (milho, sorgo e outros) na proporção de 30% do produto com 70% de farelo e fornecer 1 kg/animal/dia com disponibilidade de uma área de cocho de 30 a 40 cm lineares por animal. Fornecer puro, à vontade, em cochos cobertos preferencialmente, ou que evitem acúmulo de água. Devem ser disponibilizados de 10 a 15 cm lineares de cocho por animal e em pastos com boa oferta de massa, ou conforme a orientação do nutricionista.

Esse produto contém ureia, não fornecer para equídeos.



Linha Campo

Campo Seca Fator P



Cria, recria e terminação.

Suplemento mineral proteico para bovinos. Este produto corrige desequilíbrios nutricionais no período seco, estimulando a ingestão e digestão de alimentos fibrosos, favorecendo o rebanho a ganhar e não perder peso.

200 a 500 g/animal/dia

Produto indicado para todas as categorias de bovinos a pasto. Pode ser utilizado puro na dose mínima de 0,8 g/kg de peso vivo ou misturado a farelos energéticos (milho, sorgo e outros) na proporção de 30% do produto com 70% de farelo e fornecer 1 kg/animal/dia com disponibilidade de uma área de cocho de 30 a 40 cm lineares por animal. Fornecer puro, à vontade, em cochos cobertos preferencialmente, ou que evitem acúmulo de água. Devem ser disponibilizados de 10 a 15 cm lineares de cocho por animal e em pastos com boa oferta de massa, ou conforme a orientação do nutricionista.

Esse produto contém ureia, não fornecer para equídeos.



GARANTIA

Proteína Bruta (Mín.)	400.00	g/kg
NDT (Mín.)	300.00	g/kg
NNP – Equiv. Proteico (Máx.)	330.00	g/kg
Cálcio (Máx.)	100.00	g/kg
Cálcio (Mín.)	60.00	g/kg
Fósforo (Mín.)	15.00	g/kg
Enxofre (Mín.)	6000.00	mg/kg
Sódio (Mín.)	70.00	g/kg
Cobalto (Mín.)	25.00	mg/kg
Cobre (Mín.)	134.00	mg/kg
Zinco (Mín.)	467.00	mg/kg
Selênio (Mín.)	3.00	mg/kg
Iodo (Mín.)	16.60	mg/kg
Flúor (Máx.)	150.00	mg/kg
Metionina (Mín.)	5.10	mg/kg
Tirosina (Mín.)	12.50	mg/kg
Saccharomyces cerevisiae (Mín.)	1.25 x 10E9	ufc/kg
Lisina (Mín.)	63.00	mg/kg
Colina (Mín.)	500.00	mg/kg
Cromo orgânico (Mín.)	0.60	mg/kg
Zinco orgânico (Mín.)	13.00	mg/kg
Mananligossacarídeos (Mín.)	75.00	mg/kg
Ácido Linoleico (Mín.)	25.16	mg/kg
Ácido Oleico (Mín.)	21.35	mg/kg
Ômega 3 (Mín.)	3.69	mg/kg
Ômega 6 (Mín.)	25.16	mg/kg
Ômega 9 (Mín.)	23.50	mg/kg
Fator P (Mín.)	12.50	g/kg

kg: quilograma; **g:** grama; **mg:** miligrama; **UFC:** unidade formadora de colônia; **UI:** unidade internacional; **Kcal:** quilocaloria

Linha Campo

Campo Verão 20



GARANTIA

Zinco (Mín.)	1300.00	mg/kg
Selênio (Mín.)	6.70	mg/kg
Iodo (Mín.)	25.70	mg/kg
Flúor (Máx.)	180.00	mg/kg
Salinomicina (Mín.)	300.00	mg/kg
NDT (Mín.)	350.00	g/kg
Proteína Bruta (Mín.)	200.00	g/kg
NNP – Equiv. Proteico (Máx.)	110.00	g/kg
Cálcio (Máx.)	80.00	g/kg
Cálcio (Mín.)	50.00	g/kg
Fósforo (Mín.)	18.00	g/kg
Enxofre (Mín.)	12.00	g/kg
Sódio (Mín.)	90.00	g/kg
Cobalto (Mín.)	23.00	mg/kg
Cobre (Mín.)	350.00	mg/kg
Manganês (Mín.)	310.00	mg/kg

kg: quilograma; **g:** grama; **mg:** miligrama; **UFC:** unidade formadora de colônia; **UI:** unidade internacional; **Kcal:** quilocaloria

Cria, recria e terminação.

Suplemento mineral proteico para bovinos. Este produto corrige desequilíbrios nutricionais e potencializa a degradação da fração fibrosa, disponibilizando mais energia, além de aumentar a utilização de nitrogênio das forrageiras verdes no período das águas.

180 a 450 g/animal/dia

Indicado na suplementação mineral e proteica de bovinos de corte na fase de recria e terminação durante o período das águas. Aditivado com melhorador de desempenho e com combinação de diferentes fontes de NNP (Ureia e Ureia de liberação lenta).

Fornecer puro, à vontade, em cochos cobertos preferencialmente, ou que evitem acúmulo de água. Deve ser disponibilizado de 10 a 15 cm lineares de cocho por animal e em pastos com boa oferta de massa, ou conforme a orientação do nutricionista.

Esse produto contém ureia, não fornecer para equídeos.



Linha Campo

Concentrado Campo Águas Fator P



Cria, recria e terminação.

Este produto é exclusivo para formulação de suplemento energético para bovinos a pasto no período das águas.

Para ser misturado da seguinte maneira:

Concentrado Campo Águas Fator P - 60% + farelo energético - 26% + sal comum - 14%

Fazer o fornecimento do produto quando houver boa disponibilidade de pasto, mesmo que seco ou de baixa qualidade, para garantir melhor aproveitamento da ureia. Manter cocho sempre com o produto, para garantir melhor aproveitamento do alimento ingerido, ou conforme a orientação do nutricionista.

Esse produto contém ureia, não fornecer para equídeos.



GARANTIA

Proteína Bruta (Mín.)	134.00	g/kg
NNP – Equiv. Proteico (Máx.)	80.00	g/kg
Cálcio (Máx.)	150.00	g/kg
FDA (Máx.)	200.00	g/kg
Metionina (Mín.)	13.30	mg/kg
Tirosina (Mín.)	33.30	mg/kg
Ácido fumárico (Mín.)	4833.00	mg/kg
Saccharomyces cerevisiae (Mín.)	3.33 x 10E9	ufc/kg
Lisina (Mín.)	166.50	mg/kg
Colina (Mín.)	1332.00	mg/kg
Cromo orgânico (Mín.)	1.66	mg/kg
Zinco orgânico (Mín.)	34.96	mg/kg
Mananoligossacarídeos (Mín.)	199.00	mg/kg
Ácido Linoleico (Mín.)	67.00	mg/kg
Ácido Oleico (Mín.)	56.80	mg/kg
Ômega 3 (Mín.)	9.83	mg/kg
Ômega 6 (Mín.)	67.03	mg/kg
Ômega 9 (Mín.)	62.03	mg/kg
Umidade (Máx.)	120.00	g/kg
Cálcio (Mín.)	120.00	g/kg
Fósforo (Mín.)	56.00	g/kg
Enxofre (Mín.)	50.00	g/kg
Sódio (Mín.)	95.00	g/kg
Cobalto (Mín.)	280.00	mg/kg
Cobre (Mín.)	2400.00	mg/kg
Zinco (Mín.)	4167.00	mg/kg
Selênio (Mín.)	15.00	mg/kg
Iodo (Mín.)	200.00	mg/kg
Fibra Bruta (Máx.)	125.00	g/kg
Matéria Mineral (Máx.)	800.00	g/kg
Extrato Etéreo (Mín.)	2000.00	mg/kg

kg: quilograma; g: grama; mg: miligrama; UFC: unidade formadora de colônia; UI: unidade internacional; Kcal: quilocaloria

Linha Campo

Concentrado Campo Seca Fator P



Cria, recria e terminação.

Este produto é exclusivo para formulação de suplemento energético para bovinos a pasto no período seco.

Para ser misturado da seguinte maneira:

Concentrado Campo Seca Fator P - 40% + milho - 35% + sal comum - 25% = Campo 40

Concentrado Campo Seca Fator P - 40% + farelo de soja - 25% + milho - 17% + sal comum - 18% = Campo 50

Concentrado Campo Seca Fator P - 40% + farelo de soja - 37% + milho - 3% + sal comum - 18% + ureia - 2% = Campo 60

Concentrado Campo Seca Fator P - 25% + farelo de soja - 20% + milho - 36% + sal comum - 19% = Campo Extra

Fazer o fornecimento do produto quando houver boa disponibilidade de pasto, mesmo que seco ou de baixa qualidade, para garantir melhor aproveitamento da ureia. Manter cocho sempre com o produto, para garantir melhor aproveitamento do alimento ingerido, ou conforme a orientação do nutricionista.

Esse produto contém ureia, não fornecer para equídeos.



GARANTIA

Proteína Bruta (Mín.)	900.00	g/kg
NNP – Equiv. Proteico (Máx.)	900.00	g/kg
Cálcio (Máx.)	200.00	g/kg
Cálcio (Mín.)	150.00	g/kg
Fósforo (Mín.)	40.00	g/kg
Enxofre (Mín.)	15.00	g/kg
Sódio (Mín.)	19.00	g/kg
Cobalto (Mín.)	105.00	mg/kg
Cobre (Mín.)	572.00	mg/kg
Zinco (Mín.)	2000.00	mg/kg
Selênio (Mín.)	12.25	mg/kg
Iodo (Mín.)	70.00	mg/kg
Fibra Bruta (Máx.)	125.00	g/kg
Matéria Mineral (Máx.)	650.00	g/kg
Extrato Etéreo (Mín.)	1200.00	mg/kg
FDA (Máx.)	200.00	g/kg
Metionina (Mín.)	10.00	mg/kg
Tirosina (Mín.)	30.00	mg/kg
Saccharomyces cerevisiae (Mín.)	3.00 x 10E9	ufc/kg
Lisina (Mín.)	150.00	mg/kg
Colina (Mín.)	1200.00	mg/kg
Cromo orgânico (Mín.)	1.50	mg/kg
Zinco orgânico (Mín.)	31.50	mg/kg
Mananligossacarídeos (Mín.)	180.00	mg/kg
Ácido Linoleico (Mín.)	60.39	mg/kg
Ácido Oleico (Mín.)	51.24	mg/kg
Ômega 3 (Mín.)	8.86	mg/kg
Ômega 6 (Mín.)	60.39	mg/kg
Ômega 9 (Mín.)	56.40	mg/kg
Umidade (Máx.)	120.00	g/kg
Fator P (Mín.)	30.00	g/kg

kg: quilograma; g: grama; mg: miligrama; UFC: unidade formadora de colônia; UI: unidade internacional; Kcal: quilocaloria

Linha Campo

Fantástico Fator P



Cria, recria e terminação.

Suplemento mineral proteico para bovinos. Aditivado com Fator P.

150 a 250 g/animal/dia

Indicado para rebanhos de recria e engorda. Sua formulação contempla combinação de fontes de proteína com diferentes taxas de degradação ruminal, minerais com alta biodisponibilidade e moléculas que promovem um melhor aproveitamento da forragem, maximizando o desempenho animal. Manejo facilitado, pois o produto tem consumo regulado permitindo o fornecimento em dias alternados.

Fornecer puro, à vontade, em cochos cobertos preferencialmente, ou que evitem acúmulo de água. Deve ser disponibilizado de 10 a 15 cm lineares de cocho por animal e em pastos com boa oferta de massa, ou conforme a orientação do nutricionista.

Esse produto contém ureia, não fornecer para eqüídeos.



GARANTIA

Cobre (Mín.)	595.00	mg/kg
Manganês (Mín.)	550.00	mg/kg
Zinco (Mín.)	2200.00	mg/kg
Selênio (Mín.)	11.00	mg/kg
Iodo (Mín.)	43.00	mg/kg
Flúor (Máx.)	400.00	mg/kg
Metionina (Mín.)	12.00	mg/kg
Tirosina (Mín.)	30.00	mg/kg
Saccharomyces cerevisiae (Mín.)	3.00 x 10E9	ufc/kg
Lisina (Mín.)	150.00	mg/kg
Zinco orgânico (Mín.)	200.00	mg/kg
Mananoligossacarídeos (Mín.)	180.00	mg/kg
Ácido Linoleico (Mín.)	60.39	mg/kg
Ácido Oleico (Mín.)	51.24	mg/kg
Ômega 3 (Mín.)	8.86	mg/kg
Ômega 6 (Mín.)	60.39	mg/kg
Ômega 9 (Mín.)	56.40	mg/kg
NDT (Mín.)	120.00	g/kg
Proteína Bruta (Mín.)	250.00	g/kg
NNP – Equiv. Proteico (Máx.)	175.00	g/kg
Cálcio (Máx.)	130.00	g/kg
Cálcio (Mín.)	100.00	g/kg
Fósforo (Mín.)	40.00	g/kg
Enxofre (Mín.)	20.00	g/kg
Sódio (Mín.)	100.00	g/kg
Cobalto (Mín.)	67.00	mg/kg
Colina (Mín.)	1200.00	mg/kg
Cromo orgânico (Mín.)	4.00	mg/kg

kg: quilograma; **g:** grama; **mg:** miligrama; **UFC:** unidade formadora de colônia; **UI:** unidade internacional; **Kcal:** quilocaloria

Linha Campo

Núcleo Campo BI Fator P



Cria, recria e terminação.

Indicado para preparo de suplementos e rações para bovinos de corte a pasto.

30 a 120 g do produto misturado por animal/dia

Fornecer o produto misturado em outros ingredientes de acordo com a recomendação acima ou indicação do nutricionista. Nunca fornecer o produto puro.



GARANTIA

Selênio (Mín.)	50.00	mg/kg
Iodo (Mín.)	90.00	mg/kg
Flúor (Máx.)	1000.00	mg/kg
Metionina (Mín.)	28.00	mg/kg
Tirosina (Mín.)	40.00	mg/kg
Saccharomyces cerevisiae (Mín.)	7.00 x 10E9	ufc/kg
Lisina (Mín.)	350.00	mg/kg
Colina (Mín.)	2800.00	mg/kg
Cromo orgânico (Mín.)	3.50	mg/kg
Zinco orgânico (Mín.)	73.50	mg/kg
Mananoligossacarídeos (Mín.)	420.00	mg/kg
Ácido Linoleico (Mín.)	140.00	mg/kg
Ácido Oleico (Mín.)	119.50	mg/kg
Ômega 3 (Mín.)	20.60	mg/kg
Ômega 6 (Mín.)	140.90	mg/kg
Ômega 9 (Mín.)	131.60	mg/kg
Fator P (Mín.)	70.00	g/kg
Cálcio (Máx.)	250.00	g/kg
Cálcio (Mín.)	200.00	g/kg
Fósforo (Mín.)	100.00	g/kg
Magnésio (Mín.)	2000.00	mg/kg
Enxofre (Mín.)	100.00	g/kg
Cobalto (Mín.)	300.00	mg/kg
Cobre (Mín.)	2000.00	mg/kg
Manganês (Mín.)	400.00	mg/kg
Zinco (Mín.)	6660.00	mg/kg

kg: quilograma; **g:** grama; **mg:** miligrama; **UFC:** unidade formadora de colônia; **UI:** unidade internacional; **Kcal:** quilocaloria

Linha Campo

Protene 300 Next MC



Cria, recria e terminação.

Suplemento mineral proteico indicado para bovinos de corte, para utilização durante o período de seca. Aditivado com Fator 20A.

100 a 150 g/100 kg PC/dia

Produto pronto para uso. Colocar no cocho à disposição dos animais. Fornecer o produto em cochos cobertos e/ou com sistema que evite o acúmulo de água; manter boa disponibilidade de pasto.

Este produto contém ureia, não fornecer para equídeos.



GARANTIA

Proteína Bruta (Mín.)	300.00	g/kg
NDT (Mín.)	250.00	g/kg
NNP – Equiv. Proteico (Máx.)	253.00	g/kg
Cálcio (Máx.)	100.00	g/kg
Cálcio (Mín.)	60.00	g/kg
Fósforo (Mín.)	12.00	g/kg
Magnésio (Mín.)	1000.00	mg/kg
Enxofre (Mín.)	9000.00	mg/kg
Sódio (Mín.)	114.00	g/kg
Cobalto (Mín.)	15.00	mg/kg
Cobre (Mín.)	300.00	mg/kg
Manganês (Mín.)	135.00	mg/kg
Zinco (Mín.)	900.00	mg/kg
Selênio (Mín.)	3.00	mg/kg
Iodo (Mín.)	14.40	mg/kg
Flúor (Máx.)	120.00	mg/kg
Metionina (Mín.)	70.00	mg/kg
Tirosina (Mín.)	70.00	mg/kg
Vitamina B12 (Mín.)	16.65	µg/kg
Vitamina A (Mín.)	50000.00	ui/kg
Lisina (Mín.)	345.00	mg/kg
Níquel (Mín.)	2.00	mg/kg
Colina (Mín.)	30.00	mg/kg
Cromo orgânico (Mín.)	0.30	mg/kg
Zinco orgânico (Mín.)	10.30	mg/kg
Mananoligossacarídeos (Mín.)	166.00	mg/kg
Ácido Linoleico (Mín.)	148.00	mg/kg
Ácido Oleico (Mín.)	0.14	mg/kg
Bacillus subtilis (Mín.)	4.16 x 10E8	ufc/kg
Bifidobacterium bifidum (Mín.)	3.12 x 10E8	ufc/kg
Enterococcus faecium (Mín.)	3.12 x 10E8	ufc/kg
Lactobacillus acidophilus (Mín.)	3.12 x 10E8	ufc/kg
Lactobacillus casei (Mín.)	2.70 x 10E8	ufc/kg
Lactobacillus lactis (Mín.)	1.45 x 10E8	ufc/kg
Glucomananos (Mín.)	582.00	mg/kg
Beta glucanos (Mín.)	415.80	mg/kg

kg: quilograma; g: grama; mg: miligrama; UFC: unidade formadora de colônia; UI: unidade internacional; Kcal: quilocaloria

Linha Campo

Protene Concentrado Next MC



Cria, recria e terminação.

Concentrado indicado para bovinos de corte. Utilizar durante o período seco.

Consumo variável conforme mistura (sugestões de consumo após diluição):

Mineral proteico energético – 200 a 400 g/100 kg PC/dia

Mineral proteico – 100 a 150 g/100 kg PC/dia

Produto para misturar. Para produção de suplemento mineral proteico energético, misturar 20kg do produto em 70kg de milho moído e 10kg sal comum. Para elaboração de suplemento mineral proteico, misturar 40kg do produto em 30kg de milho moído e 30 kg sal comum.

Esse produto contém ureia e salinomicina não fornecer para equídeos.



GARANTIA

Proteína Bruta (Mín.)	700.00	g/kg
NNP – Equiv. Proteico (Máx.)	632.50	g/kg
Cálcio (Máx.)	200.00	g/kg
Cálcio (Mín.)	130.00	g/kg
Fósforo (Mín.)	30.00	g/kg
Magnésio (Mín.)	3000.00	mg/kg
Enxofre (Mín.)	24.00	g/kg
Cobalto (Mín.)	38.00	mg/kg
Cobre (Mín.)	750.00	mg/kg
Manganês (Mín.)	330.00	mg/kg
Zinco (Mín.)	2250.00	mg/kg
Selênio (Mín.)	7.50	mg/kg
Iodo (Mín.)	36.00	mg/kg
Fibra Bruta (Máx.)	125.00	g/kg
Matéria Mineral (Máx.)	610.00	g/kg
Extrato Etéreo (Mín.)	1400.00	mg/kg
FDA (Máx.)	200.00	g/kg
Flúor (Máx.)	300.00	mg/kg
Salinomicina (Mín.)	600.00	mg/kg
Vitamina A (Mín.)	125000.00	ui/kg
Níquel (Mín.)	5.00	mg/kg
Cromo orgânico (Mín.)	10.00	mg/kg
Umidade (Máx.)	120.00	g/kg

kg: quilograma; **g:** grama; **mg:** miligrama; **UFC:** unidade formadora de colônia; **UI:** unidade internacional; **Kcal:** quilocaloria

Linha PSAI & Rações

Protene 200 Next MC



Cria, recria e terminação.

Suplemento mineral proteico energético indicado para bovinos de corte durante a estação de transição águas/seca e estação seca.

220 a 440 g/100 kg PC/dia

Produto pronto para uso. Colocar no cocho à disposição dos animais. Fornecer o produto em cochos cobertos e/ou com sistema que evite o acúmulo de água; manter boa disponibilidade de pasto.

Esse produto contém ureia e salinomicina não fornecer para equídeos.

GARANTIA

NDT (Mín.)	460.00	g/kg
Proteína Bruta (Mín.)	200.00	g/kg
NNP – Equiv. Proteico (Máx.)	140.60	g/kg
Cálcio (Máx.)	50.00	g/kg
Cálcio (Mín.)	35.00	g/kg
Fósforo (Mín.)	6000.00	mg/kg
Magnésio (Mín.)	700.00	mg/kg
Enxofre (Mín.)	4500.00	mg/kg
Sódio (Mín.)	39.00	g/kg
Cobalto (Mín.)	7.50	mg/kg
Cobre (Mín.)	150.00	mg/kg
Manganês (Mín.)	67.50	mg/kg
Zinco (Mín.)	450.00	mg/kg
Selênio (Mín.)	1.50	mg/kg
Iodo (Mín.)	7.20	mg/kg
Flúor (Máx.)	60.00	mg/kg
Salinomicina (Mín.)	120.00	mg/kg
Níquel (Mín.)	1.00	mg/kg

kg: quilograma; **g:** grama; **mg:** miligrama; **UFC:** unidade formadora de colônia; **UI:** unidade internacional; **Kcal:** quilocaloria



Linha PSAI & Rações

PSAI Águas Fator P



Recria e terminação.

Suplemento proteico energético para bovinos. Este produto é nutricionalmente desenvolvido para o período das águas. Enriquecido com aditivos e minerais orgânicos, favorece a eficiência alimentar e o aumento da produtividade do rebanho.

0,3 a 0,4% do peso vivo ou 1 a 1,5 kg/animal/dia

Produto pronto para uso, indicado para bovinos em recria e terminação a pasto. Deve ser fornecido na dosagem de 0,3 a 0,4% do peso vivo em cocho de suplementação, de preferência coberto, com uma metragem disponível de 30 a 40 cm lineares/animal ou conforme a orientação do nutricionista.

Esse produto contém ureia, não fornecer para equídeos.



GARANTIA

Colina (Mín.)	160.00	mg/kg
Cromo orgânico (Mín.)	0.20	mg/kg
Zinco orgânico (Mín.)	4.20	mg/kg
Mananoligossacarídeos (Mín.)	24.00	mg/kg
Ácido Linoleico (Mín.)	8.05	mg/kg
Ácido Oleico (Mín.)	6.83	mg/kg
Ômega 3 (Mín.)	1.18	mg/kg
Ômega 6 (Mín.)	8.05	mg/kg
Ômega 9 (Mín.)	7.52	mg/kg
Fator P (Mín.)	4000.00	mg/kg
NDT (Mín.)	650.00	g/kg
Proteína Bruta (Mín.)	120.00	g/kg
NNP – Equiv. Proteico (Máx.)	22.00	g/kg
Cálcio (Máx.)	20.00	g/kg
Cálcio (Mín.)	10.00	g/kg
Fósforo (Mín.)	6000.00	mg/kg
Enxofre (Mín.)	6000.00	mg/kg
Sódio (Mín.)	22.00	g/kg
Cobalto (Mín.)	15.00	mg/kg
Cobre (Mín.)	144.00	mg/kg
Zinco (Mín.)	250.00	mg/kg
Selênio (Mín.)	0.90	mg/kg
Iodo (Mín.)	12.00	mg/kg
Extrato Etéreo (Mín.)	15.00	g/kg
Flúor (Máx.)	60.00	mg/kg
Metionina (Mín.)	1.60	mg/kg
Tirosina (Mín.)	4.00	mg/kg
Saccharomyces cerevisiae (Mín.)	4.00 x 10E8	ufc/kg
Lisina (Mín.)	20.00	mg/kg

kg: quilograma; **g:** grama; **mg:** miligrama; **UFC:** unidade formadora de colônia; **UI:** unidade internacional; **Kcal:** quilocaloria

Linha PSAI & Rações

PSAI Creep Feeding Fator P



Cria.

Suplemento proteico energético para bovinos em amamentação ou pós-desmama. Este produto estimula o desenvolvimento e o metabolismo ruminal de bezerros, proporcionando maior peso a desmama ou permitindo fazer a desmama precoce.

0,5 a 1,5 kg/animal/dia

Produto pronto para uso, indicado para animais a partir dos primeiros dias de vida (bezerros ao pé) até os 8 meses de idade. Deve ser fornecido à vontade aos animais em cochos privativos para bezerro (creep-feeding).

Este produto contém ureia, não fornecer para equídeos.



GARANTIA

NDT (Mín.)	700.00	g/kg
Proteína Bruta (Mín.)	180.00	g/kg
NNP – Equiv. Proteico (Máx.)	28.10	g/kg
Cálcio (Máx.)	20.00	g/kg
Cálcio (Mín.)	13.00	g/kg
Fósforo (Mín.)	7000.00	mg/kg
Enxofre (Mín.)	2000.00	mg/kg
Sódio (Mín.)	3800.00	mg/kg
Cobalto (Mín.)	5.00	mg/kg
Cobre (Mín.)	40.00	mg/kg
Zinco (Mín.)	775.00	mg/kg
Selênio (Mín.)	0.55	mg/kg
Iodo (Mín.)	7.00	mg/kg
Extrato Etéreo (Mín.)	15.00	g/kg
Flúor (Máx.)	70.00	mg/kg
Metionina (Mín.)	2.60	mg/kg
Tirosina (Mín.)	6.50	mg/kg
Saccharomyces cerevisiae (Mín.)	6.50 x 10E8	ufc/kg
Lisina (Mín.)	32.50	mg/kg
Colina (Mín.)	260.00	mg/kg
Cromo orgânico (Mín.)	0.33	mg/kg
Zinco orgânico (Mín.)	6.83	mg/kg
Mananligossacarídeos (Mín.)	39.00	mg/kg
Ácido Linoleico (Mín.)	13.08	mg/kg
Ácido Oleico (Mín.)	11.10	mg/kg
Ômega 3 (Mín.)	1.91	mg/kg
Ômega 6 (Mín.)	13.08	mg/kg
Ômega 9 (Mín.)	12.22	mg/kg
Fator P (Mín.)	6500.00	mg/kg

kg: quilograma; **g:** grama; **mg:** miligrama; **UFC:** unidade formadora de colônia; **UI:** unidade internacional; **Kcal:** quilocaloria

Linha PSAI & Rações

PSAI Extra Fator P



Recria e terminação.

Suplemento proteico energético para bovinos. Este produto é nutricionalmente desenvolvido para os períodos pré-seca (sementeira) e na transição de secas para águas (rebrotas). Enriquecido com aditivos e minerais orgânicos, ele favorece a eficiência alimentar e o aumento da produtividade do rebanho, com o objetivo de dar continuidade no ganho de peso de bovinos a pasto.

0,3 a 0,4% do peso vivo ou 1 a 1,5 kg/animal/dia

Produto pronto para uso, indicado para bovinos em recria e terminação a pasto. Deve ser fornecido na dosagem de 0,3 a 0,4% do peso vivo em cocho de suplementação, de preferência coberto, com uma metragem disponível de 30 a 40 cm lineares/animal ou conforme a orientação do nutricionista.

Esse produto contém ureia, não fornecer para eqüídeos.



GARANTIA

NDT (Mín.)	640.00	g/kg
Proteína Bruta (Mín.)	180.00	g/kg
NNP – Equiv. Proteico (Máx.)	62.00	g/kg
Cálcio (Máx.)	20.00	g/kg
Cálcio (Mín.)	10.00	g/kg
Fósforo (Mín.)	5000.00	mg/kg
Enxofre (Mín.)	3000.00	mg/kg
Sódio (Mín.)	22.00	g/kg
Cobalto (Mín.)	15.00	mg/kg
Cobre (Mín.)	144.00	mg/kg
Zinco (Mín.)	250.00	mg/kg
Selênio (Mín.)	0.90	mg/kg
Iodo (Mín.)	12.00	mg/kg
Extrato Etéreo (Mín.)	10.00	g/kg
Flúor (Máx.)	60.00	mg/kg
Metionina (Mín.)	1.60	mg/kg
Tirosina (Mín.)	4.00	mg/kg
Saccharomyces cerevisiae (Mín.)	4.00 x 10E8	ufc/kg
Lisina (Mín.)	20.00	mg/kg
Colina (Mín.)	160.00	mg/kg
Cromo orgânico (Mín.)	0.20	mg/kg
Zinco orgânico (Mín.)	4.20	mg/kg
Mananoligossacarídeos (Mín.)	24.00	mg/kg
Ácido Linoleico (Mín.)	8.00	mg/kg
Ácido Oleico (Mín.)	6.83	mg/kg
Ômega 3 (Mín.)	1.18	mg/kg
Ômega 6 (Mín.)	8.05	mg/kg
Ômega 9 (Mín.)	7.52	mg/kg

kg: quilograma; **g:** grama; **mg:** miligrama; **UFC:** unidade formadora de colônia; **UI:** unidade internacional; **Kcal:** quilocaloria

Linha PSAI & Rações

PSAI PP14 Fator P



Recria.

Suplemento proteico energético para bovinos. Produto indicado para bovinos em fase de recria de fêmeas precoces para inseminação a partir de 14 meses de idade.

0,3 a 0,5 % do peso vivo.

Produto pronto para uso. Deve ser fornecido na dosagem de 0,3 a 0,5 % do peso vivo em cocho de suplementação, de preferência coberto, com uma metragem disponível de 30 a 40 cm lineares/animal ou conforme a orientação do nutricionista.

Este produto contém ureia, não fornecer para equídeos.



GARANTIA

Lactobacillus acidophilus (Mín.)	3.75 x 10E8	ufc/kg
Lactobacillus casei (Mín.)	3.25 x 10E8	ufc/kg
Ômega 3 (Mín.)	1.47	mg/kg
Ômega 6 (Mín.)	10.06	mg/kg
Ômega 9 (Mín.)	9.40	mg/kg
Fator P (Mín.)	5000.00	mg/kg
NDT (Mín.)	670.00	g/kg
Proteína Bruta (Mín.)	200.00	g/kg
NNP – Equiv. Proteico (Máx.)	80.00	g/kg
Cálcio (Máx.)	20.00	g/kg
Cálcio (Mín.)	14.20	g/kg
Fósforo (Mín.)	10.00	g/kg
Magnésio (Mín.)	1800.00	mg/kg
Enxofre (Mín.)	8650.00	mg/kg
Sódio (Mín.)	20.00	g/kg
Cobalto (Mín.)	20.00	mg/kg
Cobre (Mín.)	200.00	mg/kg
Zinco (Mín.)	400.00	mg/kg
Selênio (Mín.)	3.50	mg/kg
Iodo (Mín.)	12.00	mg/kg
Extrato Etéreo (Mín.)	20.00	g/kg
Flúor (Máx.)	100.00	mg/kg
Metionina (Mín.)	2.00	mg/kg
Tirosina (Mín.)	5.00	mg/kg
Saccharomyces cerevisiae (Mín.)	5.00 x 10E8	ufc/kg
Lisina (Mín.)	25.00	mg/kg
Colina (Mín.)	200.00	mg/kg
Cromo orgânico (Mín.)	0.25	mg/kg
Zinco orgânico (Mín.)	5.25	mg/kg
Mananoligossacarídeos (Mín.)	30.00	mg/kg
Ácido Linoleico (Mín.)	10.06	mg/kg
Ácido Oleico (Mín.)	8.54	mg/kg
Bacillus subtilis (Mín.)	5.00 x 10E8	ufc/kg
Bifidobacterium bifidum (Mín.)	3.75 x 10E8	ufc/kg
Enterococcus faecium (Mín.)	3.75 x 10E8	ufc/kg

kg: quilograma; g: grama; mg: miligrama; UFC: unidade formadora de colônia; UI: unidade internacional; Kcal: quilocaloria

Linha PSAI & Rações

PSAI Prime Engorda GP Fator P



Terminação.

Suplemento proteico energético para bovinos. Este produto é nutricionalmente desenvolvido para o período de transição de águas para seca. Produto contém gordura protegida, proporcionando acabamento extra e rendimento de carcaça superior para animais em pastejo. Enriquecido com aditivos e minerais orgânicos, ele favorece a eficiência alimentar e o aumento da produtividade do rebanho.

0,5 a 0,7% do peso vivo.

Produto pronto para uso. Indicado para bovinos de corte, possibilitando acabamento extra na terminação.

Deve ser fornecido em cocho de suplementação, de preferência coberto, com uma metragem disponível de 30 a 40 cm lineares/animal ou conforme a orientação do nutricionista.

Esse produto contém ureia, não fornecer para eqüídeos.



GARANTIA

NDT (Mín.)	720.00	g/kg
Proteína Bruta (Mín.)	250.00	g/kg
NNP – Equiv. Proteico (Máx.)	110.00	g/kg
Cálcio (Máx.)	35.00	g/kg
Cálcio (Mín.)	15.00	g/kg
Fósforo (Mín.)	5000.00	mg/kg
Enxofre (Mín.)	3000.00	mg/kg
Sódio (Mín.)	10.00	g/kg
Cobalto (Mín.)	3.00	mg/kg
Cobre (Mín.)	54.00	mg/kg
Manganês (Mín.)	40.00	mg/kg
Zinco (Mín.)	200.00	mg/kg
Selênio (Mín.)	1.00	mg/kg
Iodo (Mín.)	4.00	mg/kg
Extrato Etéreo (Mín.)	58.00	g/kg
Flúor (Máx.)	50.00	mg/kg
Metionina (Mín.)	1.20	mg/kg
Tirosina (Mín.)	3.00	mg/kg
Saccharomyces cerevisiae (Mín.)	3.00 x 10E8	ufc/kg
Lisina (Mín.)	600.00	mg/kg
Colina (Mín.)	120.00	mg/kg
Cromo orgânico (Mín.)	0.15	mg/kg
Zinco orgânico (Mín.)	3.15	mg/kg
Mananligossacarídeos (Mín.)	18.00	mg/kg
Ácido Linoleico (Mín.)	6.03	mg/kg
Ácido Oleico (Mín.)	5.12	mg/kg
Ômega 3 (Mín.)	0.88	mg/kg
Ômega 6 (Mín.)	6.03	mg/kg
Ômega 9 (Mín.)	5.64	mg/kg
Fator P (Mín.)	3000.00	mg/kg

kg: quilograma; **g:** grama; **mg:** miligrama; **UFC:** unidade formadora de colônia; **UI:** unidade internacional; **Kcal:** quilocaloria

Linha PSAI & Rações

PSAI Prime Termina Águas Fator P



Terminação.

Suplemento proteico energético para bovinos. Este produto é nutricionalmente desenvolvido para animais em fase de terminação no período das águas. Enriquecido com aditivos e minerais orgânicos, ele favorece a eficiência alimentar e o aumento da produtividade do rebanho.

0,3% a 0,5% do peso vivo.

Produto pronto para uso, Indicado para bovinos de corte em fase de terminação no período das águas.

Deve ser fornecido em cocho de suplementação, de preferência coberto, com uma metragem disponível de 30 a 40 cm lineares/animal ou conforme a orientação do nutricionista.

Esse produto contém ureia, não fornecer para equídeos.



GARANTIA

Proteína Bruta (Mín.)	210.00	g/kg
NDT (Mín.)	760.00	g/kg
NNP – Equiv. Proteico (Máx.)	68.00	g/kg
Cálcio (Máx.)	25.00	g/kg
Cálcio (Mín.)	10.00	g/kg
Fósforo (Mín.)	6000.00	mg/kg
Enxofre (Mín.)	5000.00	mg/kg
Sódio (Mín.)	10.00	g/kg
Cobalto (Mín.)	8.00	mg/kg
Cobre (Mín.)	135.00	mg/kg
Manganês (Mín.)	104.00	mg/kg
Zinco (Mín.)	500.00	mg/kg
Selênio (Mín.)	2.60	mg/kg
Iodo (Mín.)	10.00	mg/kg
Extrato Etéreo (Mín.)	60.00	g/kg
Flúor (Máx.)	60.00	mg/kg
Metionina (Mín.)	1.20	mg/kg
Tirosina (Mín.)	3.00	mg/kg
Saccharomyces cerevisiae (Mín.)	3.00 x 10E8	ufc/kg
Lisina (Mín.)	15.00	mg/kg
Colina (Mín.)	120.00	mg/kg
Zinco orgânico (Mín.)	3.15	mg/kg
Mananoligossacarídeos (Mín.)	18.00	mg/kg
Ácido Linoleico (Mín.)	6.00	mg/kg
Ácido Oleico (Mín.)	5.12	mg/kg
Ômega 3 (Mín.)	0.88	mg/kg
Ômega 6 (Mín.)	6.00	mg/kg
Ômega 9 (Mín.)	5.64	mg/kg

kg: quilograma; **g:** grama; **mg:** miligrama; **UFC:** unidade formadora de colônia; **UI:** unidade internacional; **Kcal:** quilocaloria

Linha PSAI & Rações

PSAI Seca Fator P



Recria e terminação.

Suplemento proteico energético para bovinos. Este produto é nutricionalmente desenvolvido para o período da seca. Enriquecido com aditivos e minerais orgânicos, ele favorece a eficiência alimentar e o aumento da produtividade do rebanho.

0,3 a 0,4% do peso vivo.

Produto pronto para uso, indicado para bovinos em recria e terminação a pasto. Deve ser fornecido na dosagem de 0,3 a 0,4% do peso vivo em cocho de suplementação, de preferência coberto, com uma metragem disponível de 30 a 40 cm lineares/animal ou conforme a orientação do nutricionista.

Esse produto contém ureia, não fornecer para equídeos.



GARANTIA

Metionina (Mín.)	1.60	mg/kg
Tirosina (Mín.)	4.00	mg/kg
Saccharomyces cerevisiae (Mín.)	4.00 x 10E8	ufc/kg
Lisina (Mín.)	20.00	mg/kg
Colina (Mín.)	160.00	mg/kg
Cromo orgânico (Mín.)	0.20	mg/kg
Zinco orgânico (Mín.)	4.20	mg/kg
Mananligossacarídeos (Mín.)	24.00	mg/kg
Ácido Linoleico (Mín.)	8.05	mg/kg
Ácido Oleico (Mín.)	6.83	mg/kg
Ômega 3 (Mín.)	1.18	mg/kg
Ômega 6 (Mín.)	8.05	mg/kg
Ômega 9 (Mín.)	7.52	mg/kg
Fator P (Mín.)	4000.00	mg/kg
NDT (Mín.)	620.00	g/kg
Proteína Bruta (Mín.)	240.00	g/kg
NNP – Equiv. Proteico (Máx.)	118.00	g/kg
Cálcio (Máx.)	20.00	g/kg
Cálcio (Mín.)	10.00	g/kg
Fósforo (Mín.)	5000.00	mg/kg
Enxofre (Mín.)	3000.00	mg/kg
Sódio (Mín.)	22.00	g/kg
Cobalto (Mín.)	7.50	mg/kg
Cobre (Mín.)	40.00	mg/kg
Zinco (Mín.)	140.00	mg/kg
Selênio (Mín.)	0.90	mg/kg
Iodo (Mín.)	5.00	mg/kg
Extrato Etéreo (Mín.)	10.00	g/kg
Flúor (Máx.)	50.00	mg/kg

kg: quilograma; **g:** grama; **mg:** miligrama; **UFC:** unidade formadora de colônia; **UI:** unidade internacional; **Kcal:** quilocaloria

Linha PSAI & Rações

Ração Bovinos 16% Fator P



Cria, recria e terminação.

Ração para bovinos. Enriquecida com minerais e aminoácidos que favorecem a eficiência alimentar e o aumento da produtividade do rebanho. Esse produto é aditivado com Fator P para melhor conversão alimentar.

1,8 a 7 kg/animal/dia

Produto pronto para uso, indicado para bovinos em pastejo ou confinados. Deve ser fornecido aos animais em cocho de suplementação, de preferência coberto. Bovinos confinados ou semiconfinados devem ser adaptados. Na primeira semana fornecer até 0,6% do peso vivo, podendo chegar ao máximo de 1,3% dele, com disponibilidade de uma área de cocho de 40 a 60 cm lineares/animal ou conforme a orientação do nutricionista.

Esse produto contém ureia, não fornecer para equídeos.



GARANTIA

Ácido Linoleico (Mín.)	2.01	mg/kg
Ácido Oleico (Mín.)	1.70	mg/kg
Ômega 3 (Mín.)	0.29	mg/kg
Ômega 6 (Mín.)	2.01	mg/kg
Ômega 9 (Mín.)	1.88	mg/kg
Umidade (Máx.)	120.00	g/kg
Fator P (Mín.)	1000.00	mg/kg
NDT (Mín.)	680.00	g/kg
Proteína Bruta (Mín.)	160.00	g/kg
NNP – Equiv. Proteico (Máx.)	50.00	g/kg
Cálcio (Máx.)	30.00	g/kg
Cálcio (Mín.)	17.00	g/kg
Fósforo (Mín.)	4000.00	mg/kg
Enxofre (Mín.)	1000.00	mg/kg
Sódio (Mín.)	1500.00	mg/kg
Cobalto (Mín.)	1.30	mg/kg
Cobre (Mín.)	15.00	mg/kg
Zinco (Mín.)	50.00	mg/kg
Selênio (Mín.)	0.04	mg/kg
Iodo (Mín.)	0.01	mg/kg
Fibra Bruta (Máx.)	125.00	g/kg
Matéria Mineral (Máx.)	150.00	g/kg
Extrato Etéreo (Mín.)	10.00	g/kg
FDA (Máx.)	200.00	g/kg
Flúor (Máx.)	40.00	mg/kg
Metionina (Mín.)	1000.00	mg/kg
Tirosina (Mín.)	6400.00	mg/kg
Saccharomyces cerevisiae (Mín.)	1.00 x 10E8	ufc/kg
Lisina (Mín.)	1000.00	mg/kg
Colina (Mín.)	40.00	mg/kg
Cromo orgânico (Mín.)	0.05	mg/kg
Zinco orgânico (Mín.)	1.05	mg/kg
Mananoligossacarídeos (Mín.)	6.00	mg/kg

kg: quilograma; **g:** grama; **mg:** miligrama; **UFC:** unidade formadora de colônia; **UI:** unidade internacional; **Kcal:** quilocaloria

Linha PSAI & Rações

Ração Bovinos 18% Fator P



Cria, recria e terminação.

Ração para bovinos. Enriquecida com minerais e aminoácidos que favorecem a eficiência alimentar e o aumento da produtividade do rebanho. Esse produto é aditivado com Fator P para melhor conversão alimentar.

1,8 a 7 kg/animal/dia

Produto pronto para uso, indicado para bovinos em pastejo ou confinados. Deve ser fornecido aos animais em cocho de suplementação, de preferência coberto. Bovinos confinados ou semiconfinados devem ser adaptados. Na primeira semana fornecer até 0,6% do peso vivo, podendo chegar ao máximo de 1,3% dele, com disponibilidade de uma área de cocho de 40 a 60 cm lineares/animal ou conforme a orientação do nutricionista.

Esse produto contém ureia, não fornecer para equídeos.



GARANTIA

FDA (Máx.)	200.00	g/kg
NDT (Mín.)	680.00	g/kg
Proteína Bruta (Mín.)	180.00	g/kg
NNP – Equiv. Proteico (Máx.)	50.00	g/kg
Cálcio (Máx.)	30.00	g/kg
Cálcio (Mín.)	17.00	g/kg
Fósforo (Mín.)	4000.00	mg/kg
Enxofre (Mín.)	1000.00	mg/kg
Sódio (Mín.)	1500.00	mg/kg
Cobalto (Mín.)	1.30	mg/kg
Cobre (Mín.)	15.00	mg/kg
Zinco (Mín.)	50.00	mg/kg
Selênio (Mín.)	0.04	mg/kg
Iodo (Mín.)	0.01	mg/kg
Fibra Bruta (Máx.)	125.00	g/kg
Matéria Mineral (Máx.)	150.00	g/kg
Extrato Etéreo (Mín.)	10.00	g/kg
Flúor (Máx.)	40.00	mg/kg
Metionina (Mín.)	1000.00	mg/kg
Tirosina (Mín.)	1000.00	mg/kg
Saccharomyces cerevisiae (Mín.)	1.00 x 10E8	ufc/kg
Lisina (Mín.)	1000.00	mg/kg
Colina (Mín.)	40.00	mg/kg
Cromo orgânico (Mín.)	0.05	mg/kg
Zinco orgânico (Mín.)	1.05	mg/kg
Mananligossacarídeos (Mín.)	6.00	mg/kg
Ácido Linoleico (Mín.)	2.01	mg/kg
Ácido Oleico (Mín.)	1.70	mg/kg
Ômega 3 (Mín.)	0.29	mg/kg
Ômega 6 (Mín.)	2.01	mg/kg
Ômega 9 (Mín.)	1.88	mg/kg
Umidade (Máx.)	120.00	g/kg
Fator P (Mín.)	1000.00	mg/kg

kg: quilograma; **g:** grama; **mg:** miligrama; **UFC:** unidade formadora de colônia; **UI:** unidade internacional; **Kcal:** quilocaloria

Linha PSAI & Rações

Ração TIP Fator P



Terminação

Ração para bovinos. Enriquecida com aditivos e minerais orgânicos ela favorece a eficiência alimentar e o aumento da produtividade do rebanho.

0,5 a 1,5% de Peso Vivo/dia

Produto pronto para uso, consumo varia de 0,5 a 1,5% de Peso Vivo, conforme a indicação do nutricionista. Deve ser fornecido aos animais em cocho de suplementação, de preferência coberto. Bovinos confinados ou semi-confinados devem ser adaptados. Na primeira semana fornecer até 0,6% do peso vivo, podendo chegar ao máximo de 1,3% do peso vivo, com disponibilidade de uma área de cocho de 40 a 60 cm lineares/animal.

Esse produto contém ureia, não fornecer para equídeos.



GARANTIA

Enxofre (Mín.)	1000.00	mg/kg
NDT (Mín.)	740.00	g/kg
Proteína Bruta (Mín.)	140.00	g/kg
NNP – Equiv. Proteico (Máx.)	30.00	g/kg
Cálcio (Máx.)	20.00	g/kg
Cálcio (Mín.)	12.00	g/kg
Fósforo (Mín.)	2500.00	mg/kg
Magnésio (Mín.)	2700.00	mg/kg
Sódio (Mín.)	3000.00	mg/kg
Cobalto (Mín.)	3.00	mg/kg
Cobre (Mín.)	20.00	mg/kg
Manganês (Mín.)	40.00	mg/kg
Zinco (Mín.)	70.00	mg/kg
Selênio (Mín.)	0.03	mg/kg
Iodo (Mín.)	1.00	mg/kg
Fibra Bruta (Máx.)	120.00	g/kg
Matéria Mineral (Máx.)	150.00	g/kg
Extrato Etéreo (Mín.)	30.00	g/kg
FDA (Máx.)	200.00	g/kg
Metionina (Mín.)	1.00	mg/kg
Tirosina (Mín.)	1.00	mg/kg
Vitamina E (Mín.)	4.50	ui/kg
Saccharomyces cerevisiae (Mín.)	1.00 x 10E8	ufc/kg
Lisina (Mín.)	100.00	mg/kg
Tamponante (Mín.)	4500.00	mg/kg
Colina (Mín.)	40.00	mg/kg
Cromo orgânico (Mín.)	0.05	mg/kg
Zinco orgânico (Mín.)	1.05	mg/kg
Mananoligossacarídeos (Mín.)	6.00	mg/kg
Ácido Linoleico (Mín.)	2.01	mg/kg
Ácido Oleico (Mín.)	1.71	mg/kg
Adsorvente de micotoxinas (Mín.)	5000.00	mg/kg
Ômega 3 (Mín.)	0.29	mg/kg
Ômega 6 (Mín.)	2.01	mg/kg
Ômega 9 (Mín.)	1.88	mg/kg
Umidade (Máx.)	120.00	g/kg
Fator P (Mín.)	1000.00	mg/kg

kg: quilograma; g: grama; mg: miligrama; UFC: unidade formadora de colônia; UI: unidade internacional; Kcal: quilocaloria

Rua Milton José Robusti, 75
17º andar, sala 1701
Jardim Botânico - CEP: 14021-613
Ribeirão Preto - SP

PREMIX.COM.BR



 **16 3605-2900**

PremiX

